

# L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (☉, I. P., O ☉), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodius paléarctiques*, *Histerides* français.

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides*, *Nitidulides*, *Cucujides*, *Erotylides*, *Phalacridés*, *Lathridiides*.

Maurice PIC, DIJON (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe*, *Melyridés*, *Plinidés*, *Nanophyes*, *Anthicidés*, *Pedilidés*, *Critoceridés*, etc du globe. — *Cerambycidés* de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocéphalidés paléarctiques*, *Malacodermes* du globe.

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>), *Coléoptères* de France (*Curculionidés* exceptés.)

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Dijon

(8 Février 1927)

## SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (*suite*).

Hyménoptères nouveaux II, par M. Pic (*fin*).

Malacodermes exotiques, par M. Pic (*suite du hors-texte*).

Additions à la liste de Coléoptères et Hémiptères des environs de Clermont et des bords de l'Allier, par P. PIONNEAU.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (*suite*).

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France: 7 francs. | Étranger: 12 francs.

MOULINS  
LES IMPRIMERIES RÉUNIES  
15, RUE D'ENGHEN, 15

# ANNONCES

|                       |        |                          |        |
|-----------------------|--------|--------------------------|--------|
| La page . . . . .     | 32 fr. | Le 1/4 de page . . . . . | 10 fr. |
| La 1/2 page . . . . . | 18 fr. | Le 1/8 de page . . . . . | 6 fr.  |

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

*En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

# ANNONCES

1° Le D<sup>r</sup> Dallas, Président de la Société Entomologique Argentine cherche un collègue assez aimable pour lui déterminer, à l'occasion, quelques Acariens, parasites des coléoptères argentins.

2° Le D<sup>r</sup> Dallas serait heureux de recevoir fiches bibliographiques, separatas, citations, cas, dessins et en général tout le matériel se rapportant aux coléoptères monstrueux, anormaux, difformes, hybrides et hermaphrodites, pour un ouvrage qu'il a en préparation.

Adresse :

**D<sup>r</sup> DALLAS, Société Entomologique Argentine, Musée National Buenos-Aires, Argentine. Rue B. de Irigoyen, 331.**

---

## "Miscellanea Entomologica"

*Revue entomologique internationale*

|  |        |
|--|--------|
| Abonnement annuel, édition complète<br>(avec ouvrages) . . . . . | 20 fr. |
| Edition réduite . . . . .  | 10 fr. |
| Annonces seules . . . . .  | 5 fr.  |

*Direction et Rédaction : E. BARTHE*  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

## Pour les déterminations

*Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.*

*Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

*Rhagonycha barbara* v. nov. *Bettingeri*. Thorace rufo, postice signaturis nigris M formantibus ornato. Tunisie (Dr Bettinger); Algérie (coll. Pic).

*Ostoma grossa* v. nov. *discithorax*. Supra rufus, capite thoraceque medio nigris. Valachie, à Sinaia (coll. Pic).

*Pogonochærus hispidulus* v. nov. *Bickhardti*. Elytris antice late albis, ad basin paulo nigro pilosis, carina interna nigro bifasciculata. Allemagne (Bickhardt in coll. Pic). — Variété caractérisée par la partie blanche non bordée de noir en arrière et la côte interne ayant deux fascicules noirs, au lieu de trois.

*Pogonochærus Perroudi* v. nov. *Vaulogeri*. Sat angustatus, elytris late albo pubescentibus, reducte assymetrico nigro fasciculatis. Algérie: Ouarsenis (Vauloger, in coll. Pic). — Chez cette variété les fascicules de poils noirs ne sont pas disposés régulièrement et se trouvent en nombre réduit sur l'une des élytres.

*Agapanthia lateralis* s.-esp. *bilateralis*. Sat robustus, elytris non uniformiter luteo pubescentibus, externe griseo vittatis. Turkestan (coll. Pic). — Près de la bordure externe jaune se montre une bande grise longitudinale qui caractérise cette nouvelle race.

*Agapanthia Dahli* s.-esp. *nicosiensis*. Angustatus, nigro-subæneus, pro parte luteo pubescens, elytris irregulariter et longe hirsutis, luteo, lateraliter longiore, pubescentibus, his elongatis; articulo 1° antennarum nigro, subarcuato, articulis 3 et sequentibus testaceis, apice nigris, 3° longissimo, apice nigro fasciculato; vertice sulcato et luteo lineato; thorace parum breve, sat lato, fortiter denseque punctato, luteo trilineato; scutello luteo; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, postice attenuatis, mediocre et diverse sed parum dense punctatis; antennis corpore sat longe superantibus. Long. 16 à 18 mill. Chypre (coll. Pic). — Semble caractérisé par les élytres à mouchetures pubescentes peu distinctes, le 3° article des antennes plus long que d'ordinaire.

*Agapanthia asphodeli* v. nov. *mimica*. Elytris dense et regulariter, lateraliter densiore luteo pubescentibus. Pyr.-Or. (coll. Pic). — Par son revêtement mime *Kirbyi* Gglb., en diffère par les élytres ornées postérieurement de longs poils dressés, le 3° article des antennes plus long et dépourvu de houpette pileuse.

*Agapanthia cynaræ* v. nov. *diversicornis*. Articulis 3 et sequentibus antennarum pro parte nigris, pro parte rufis. Albanie (coll. Pic). — Variété caractérisée par la coloration des antennes.

J'ai reçu dernièrement en communication, par l'intermédiaire de notre collègue Clermont, un *Cryptocephalus* Geof. recueilli par le frère Hilaire, dans la vallée

d'Ossau, et que je considère comme étant *C. elongatus* Germ., espèce que je ne connaissais pas encore de France.

*Leianisorhynchus pubescens* n. sp. Oblongus, sat dense griseo pubescens, rufus, elytris nigris, sutura epipleuris rufescentibus, capite postice subalutaceo, sparse et inæquale punctato, rostro robusto; antennis gracilibus; thorace subglobuloso, fortiter parum sparse punctato; scutello indistincte; elytris oblongis, valde convexis, antice et postice attenuatis, humeris nullis, lineato-punctatis, fere instriatis, intervallis latis, distincte et sparse punctatis; pedibus sat robustis, pilosis. Long. 5 mill. Asie M<sup>re</sup> (coll. Pic). — Diffère de *brunnescens* Pic par le corps plus pubescent, la ponctuation moins espacée du prothorax, les élytres moins courtes, etc.

*Sciaphilus innotatus* n. sp. Elongatus, pro majore parte albo squamulosus, niger, rostro apice, membris pygidioque rufis; capite fortiter et sparse punctato, collo robusto, oculis prominulis, rostro breve, antice arcuate cicatricoso; antennis gracilibus; thorace sat breve et parum lato, antice paulo marginato, fortiter parum sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, humeris rotundatis, medio paulo dilatatis, postice attenuatis, substriatis, intervallis postice setis albidis parvis minutis; pedibus sat gracilibus. Long. 4 mill. Chypre (coll. Pic). — Sans doute voisin de *S. asiaticus* Desbr. que je ne connais pas en nature, et en différant, à première vue, par les élytres à revêtement uniforme.

(A suivre.)

M. Pic.

## Hyménoptères nouveaux. II <sup>(1)</sup>

PAR M. PIC (fin).

*Ichneumon ruficeps* v. nov. *maximorufus* ♀ Metathorace rufo notato, abdomine fere uniformiter rufo. Haute-Savoie.

*Ichneumon cessator* v. nov. *oisanensis* ♀. Segmento 2<sup>o</sup> abdominis rufo notato. Isère.

*Amblyteles inaciculatus* n. sp. — Angustatus, niger, luteo notatus, antennis nigris, pedibus pro majore parte rufis aut luteis, postpetiole et abdomine apice nigris, illo medio diverse rufo-luteo notato, 4<sup>o</sup> segmente abdominis implicato. Long. 17-18 mill. Morvan (Pic). — Voisin de *culpatorius* Grav. et en différant, à première vue, par le postpetiole non aciculé, mais fortement plissé et ruguleux. Varie de coloration abdominale, la forme type avec le 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> segments entièrement roux; la var. *nigrobinotatus*: avec le 2<sup>e</sup> segment largement, et le 3<sup>e</sup> brièvement, marqués de noir.

*Arge ustulata* v. nov. *stigmatica*. Ailes ayant leur stigma largement foncé avec la trace d'une bande substigmaticale foncée. Morvan (Pic).

*Allantus Schæfferi* Kl. Variétés nouvelles, de Saône-et-Loire ♂, à 2<sup>e</sup> segment dorsal de l'abdomen noir, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> fasciés, les autres maculés de jaune: v. *Viturati*; plusieurs segments tout noirs, 2<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> au moins, et 4<sup>e</sup> fascié: v. *distinctiventris*.

*Allantus amænus* Grav. Variétés nouvelles, de Saône-et-Loire. ♂, à segments 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup>, de l'abdomen, entièrement jaunes, les autres, sauf le 2<sup>e</sup> qui est tout noir en dessus,

(1) Voir commencement, in l'*Echange*, n<sup>o</sup> 425, 1926, p. 11.

*Curtos bilineatus* n. sp. Elongatus, subnitidus, rufescens, capite nigro, thorace elytrisque testaceis, illo medio piceo notato, illis ad suturam antice piceo vittatis, abdomine apice albo. Long. 7 mill. Chine. — Espèce très distincte par ses élytres ornées de bandes longitudinales.

*C. Rouyeri* n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, elytris apice piceis, capite rufo, antennis, tibiis, tarsis abdomineque nigris, illo apice albo. Long. 5 mill. Sumatra. — Diffère, à première vue de *Motschulskyi* E. Ol., par le prothorax concolor et l'écusson testacé.

*C. flaviceps* n. sp. Elongatus, parum nitidus, flavo-testaceus, antennis, pedibus pro parte abdomineque medio piceis, elytris apice obscurioribus. Long. 4 mill. Bornéo. — Distinct, à première vue, du précédent par la tête plus pâle et le dessous moins foncé.

*Luoiola curticollis* n. sp. Angustatus, niger, thorace, scutello, femoribus et infra corpore testaceis, elytris nigris, ad suturam antice testaceo marginatis; thorace breve et lato, elytris, paulo latiore. Long. 14 mill. Tonkin. — Voisin de *Clara* E. Ol., en diffère par le prothorax plus large, l'abdomen testacé, seulement un peu rembruni sur les segments médians.

*L. binhana* n. sp. Elongatus, nitidus, flavus, capite, antennis, tarsis et infra corpore pro parte nigris, elytris brunnescentibus, flavo marginatis, irregulariter punctatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *limbatipennis* Pic, élytres moins allongées, plus pâles sur le pourtour et pattes plus claires.

*L. nigritarsis* n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite, palpis, antennis tarsisque nigris, elytris apice breve nigro maculatis, his dense punctatis, capite paulo excavato; thorace prominulo, medio sulcato, fortiter punctato. Long. 7 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *succincta* Brg., mais plus petit et dessous du corps entièrement clair.

*L. bicoloripes* n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus elytris apice vage brunneo notatis, capite, antennis, tibiis pro parte, tarsis abdomineque nigris, illo apice testaceo; thorace breve et lato; elytris in disco fortiter bicostatis, irregulariter punctatis. Long. 9 mill. Tonkin. — Voisin de *ovalis* Hop., distinct, à première vue, par sa coloration.

*L. multicostulata* n. sp. Elongatus, parallelus, fere opacus, aurantiacus, capite flavo; antennis, pectore pro parte pedibusque pro majore parte piceis, elytris aurantiacis, apice late nigris et lateraliter medio nigro limbatis, his dense punctatis et multi costulatis. Long. 5 mill. Indes-Mér. — A placer près de *nigripes* Gorh. dont il diffère, à première vue, par sa coloration élytrale et ses costules nettes.

*L. Maindroni* n. sp. Parum elongatus, fere opacus, nigro-piceus, thorace pro parte aurantiaco et marginato, scutello elytrisque ad basin et medio late aurantiacis, abdomine apice albo. Long. 5 mill. Malabar. — Moins étroit que le précédent, plus largement marqué de noir, élytres avec une côte humérale plus forte que les discales.

*L. aurantiaca* n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, aurantiacus, antennis, tarsis et segmento medio abdominis nigris, tibiis apice aliquot brunneis; thorace brevis et lato, medio postice sulcato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subcostulatis, dense subfoveolato-punctatis. Long. 8 mill. Indes-Mér. — A placer près de *ochracea* Gorh., en diffère par l'aspect brillant, l'abdomen n'ayant qu'un segment noir, etc.

**Pyrocœlia Lacordairei** v. nov. *laterufa*. Elytris aurantiacis, postice longe nigro notatis. Java.

**Lucidota bipartita** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace testaceo, medio rubro, postice nigro-notato, elytris ad basin late testaceis, abdomine flavo notato; antennis longe sat late flabellatis; thorace sat elongato, fere ogivale; elytris thorace non latioribus, elongatis, subparallelis. Long. 10-11 mill. Paraguay (coll. Hicker et Pic). — Voisin de *thoracica* E. Ol., distinct par la coloration particulière des élytres.

**Dryptelytra longipennis** n. sp. Angustatus, parallelus, brunnescens, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his longitudinaliter piceo vittatis, vittis postice oblitteratis; abdomine ad basin et apice testaceo notato. Long. 18 mill. Pérou. — Espèce très distincte entre toutes par ses élytres très longues, ayant chacune une bande foncée incomplète, plus large et discale vers la base, touchant les côtés postérieurement.

**Dodacles basalis** n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, elytris ad basin aurantiaco fasciatis, abdomine apice flavo. Long. 15 mill. Paraguay. — Voisin de *erebeus* E. Ol., s'en distingue, à première vue, par les élytres ornées d'une bordure basale ondulée orangée.

**D. bicoloricornis** n. sp. Elongatus, aurantiacus, antennis apice, elytris apice late, pectore abdomineque postice pro majeure parte nigris. Long. 14 mill. Brésil. — Voisin de *elegans* E. Ol., prothorax moins robuste et sommet des élytres plus largement noir.

**D. atrimembris** n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris antice late aurantiacis, abdomine apice flavo notato. Long. 15 mill. Paraguay. — Voisin de *nigricollis* Gorb., en diffère par les rameaux des antennes plus longs, et les élytres bien plus largement noires postérieurement.

**D. 4-notatus** n. sp. Parum elongatus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, ad basin et presuturalis reducte nigro lineatis, abdomine apice flavo notato. Long. 18 mill. Amérique M<sup>e</sup>. — Espèce très distincte par ses dessins noirs particuliers. A placer près de *attenuatus* E. Ol.

**Galyptocephalus boliviensis** n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter aurantiaco, elytris rugulosis, antice externe aurantiaco limbatis et ad medium late aurantiaco maculatis, signaturis lateraliter junctis. Long. 8 mill. Bolivie. — A placer près de *picturatus* E. Ol.

**C. externus** n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter et elytris ad medium late aurantiacis, macula ad humeros externe prolongata. Long. 13 mill. Brésil. — Voisin de *maculatus* Pic, coloration noire plus étendue sur les élytres, avec le prothorax moins avancé sur son milieu antérieur.

**Psilocladus fasciatus** n. sp. Elongatus, parallelus, niger, thorace lateraliter aurantiaco, elytris, ad humeros aurantiaco maculatis et ad medium aurantiaco fasciatis. Long. 5 mill. Equateur. — Voisin de *peruvianus* Kirch., élytres fasciées et non maculées.

**P. guyanensis** n. sp. Oblongus, piceus, thorace lateraliter et antice testaceo; elytris parum latis, costulatis. Long. 6 mill. Guyane Française. — A placer près de *melas* E. Ol., et distinct, à première vue, par son prothorax différent.

**Megalophthalmus major** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, capite et infra corpore nigro-piceis, supra testaceus, thorace medio, scutello ad basin et elytris antice in disco brunneo notatis, his fortiter tricotatis; antennis piceis, ramulis testaceis, longis et valde depressis; thorace arcuato et reducte bicarinato. Long. 14 mill. Colombie. — Espèce distincte, à première vue, par sa grande taille jointe à sa coloration.

**Photurus** s.-g. nov. **Cephalophoturis**. Forma angustata; capite medio valde excavato, oculis validissimis, prominulis; antennis medio depressis, articulis ultimis angustatis; pedibus gracilibus. — Sous-genre établi pour l'espèce suivante, caractérisé surtout par la structure de la tête qui rappelle celle de *Ichthyurus* West.

**Cephalophoturis excavaticeps** n. sp. Angustatus, parum nitidus, niger, capite medio et antice, antennis apice, thorace, illo medio nigro vittato, femoribus ad basin elytrisque aurantiacis, his apice nigro-piceo notatis, sutura antice picea. Long. 12 mill. Bolivie.

**Bicellonycha atra** n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, paulo fuliginosus, capite infra oculos, albo notato, thorace lateraliter parum distincte rufo-marginato, elytris distincte et antice oblique costatis. Long. 8 mill. Amérique M<sup>le</sup>. — Espèce très distincte par sa coloration.

**B. postscutellaris** n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, thorace lateraliter late et elytris antice et externe rubro-aurantiacis; elytris medio oblique costatis. Long. 10 mill. Vénézuëla. — Voisin de *pulchella* E. Ol., coloration élytrale différente, prothorax à bande médiane noire plus large, etc.

**B. bipartita** n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, capite ad oculos, pectore pro parte, femoribus ad basin, thorace lateraliter elytrisque antice late aurantiacis; abdomine albo maculato. Long. 13 mill. Guyane. — Voisin du précédent, mais élytres sans ligne présuturale basale noire.

**Photurocantharis prescutellaris** n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, tarsi, abdomine, illo albo notato et apice rufo, elytrisque nigris, his antice medio triangulariter rufo-testaceo notatis, externe antice rufo-testaceo marginatis. Long. 10 mill. Amazones. — Voisin de *nitidipennis* Pic, très distinct par sa particulière coloration élytrale.

**Attalus rugipennis** v. nov. **maculatithorax**. Thorace rufo, antice medio nigro maculato. Le Cap. (coll. Hicker et Pic).

**A. inrugatus** n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-viridescens, antennis ad basin thoraceque rufis; capite lato, parum punctato; thorace transverso, postice paulo attenuato; elytris thorace non latioribus, postice paulo dilatatis, parum elongatis, minute sat dense punctatis. Long. 5 mill. Abyssinie. — Voisin de *rugipennis* Ab., en diffère par les élytres plus longues, à sculpture plus fine.

**Troglops viridimetallicus** n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis, tibiis 4 anticis tarsisque pro parte testaceis; capite depresso, medio paulo excavato, post oculos minute tuberculato, antennis filiformibus, elongatis; thorace breve et lato, postice paulo strangulato; elytris elongatis, ruguloso-punctatis. Long. 2,5 mill. Zanzibar. — Espèce très distincte par son prothorax court et sa coloration générale métallique.

*Stenothemus refossicollis* Champ. (*Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1926, p. 126), nec Pic, à ongles simples et angles postérieurs du prothorax proéminents, devra prendre le nom de *Championi* mihi.

*Podabrus refossicollis* Pic, a les ongles di-semblables, l'un étant courtement denté l'autre simple, le prothorax étroit, à angle postérieur peu saillant, la tête très rétrécie derrière les yeux, et peut rentrer dans un nouveau sous-genre que je nomme *Falsopodabrus*.

*Silidius breveapicalis* n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, testaceus, capite abdomineque nigris, antennis nigris, aliquot pro parte brunnescentibus; thorace antice attenuato et arcuato, medio postice late impresso-fossulato, lateraliter postice valde inciso, longe dentato et longe sinuatoque lobato; elytris elongatis, testaceis, apice breve atro-vio-laceo notatis (forma typica), aut dimidio postice violaceis (*var. lateapicalis*); abdomine apice cupuliforme, infra inciso et lobato. Long. 8-9 mill. Uganda (coll. Hicker et Pic). — Espèce caractérisée par sa coloration apicale, non franchement noire mais violacée, conjointement à sa structure thoracique.

*S. Conradti* v. nov. *innotatus*. Elytris rufis, concoloribus. Cameroun (coll. Hicker et Pic).

*S. Hickeri* n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, niger, elytris luteis, apice sat late nigris, antennis paulo dentatis; thorace sat breve et parum lato, medio postice impresso-fossulato, lateraliter postice paulo inciso, curte dentato et breve lateque lobato; elytris subparallelis, sat elongatis. Long. 8 mill. Afrique Or. (coll. Hicker et Pic). — Voisin de *tanganikanus* Pic, prothorax différent, élytres plus brillantes et moins densément ponctuées.

*S. lineaticeps* n. sp. ♂. Parum elongatus, subnitidus, rufus, membris, abdomine elytrisque apice breve nigris, capite inter oculos transverse nigro vittato, oculis validis, antennis gracilibus; thorace breve et lato, antice arcuato, medio impresso et piceo notato, lateraliter postice inciso, fortiter dentato et lobo inciso munito; scutello brunnescente; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, fortiter et dense punctatis. Long. 7 mill. Afrique Or. — A placer près de *Anceyi* Pic, élytres moins longues, antennes plus grêles, etc.

*Daiphron minutum* n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, capite externe, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice parum late nigris. Long. 8 mill. Pérou. — Ressemble beaucoup à *subparallelum* Pic, plus petit et plus étroit, le prothorax compris, avec les antennes plus épaisses.

*D. bisignatum* n. sp. Parum elongatus, opacus, capite externe et thorace lateraliter aurantiacis, elytris nigris, ad humeros lineato et post medium fasciato aurantiacis, his incostatis. Long. 9 mill. Pérou. — Voisin du précédent, distinct, à première vue, par les dessins des élytres.

Le *D. vicinum* mihi, du Vénézuéla, ressemble au précédent par sa coloration, mais la bande humérale est jointe à la fascie sur les côtés, les élytres présentent des côtes nettes et les antennes sont moins larges.

maculés ou fasciés de jaune: v. *digoniensis*; 2<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> segments noirs en dessus, 5<sup>e</sup> jaune, les autres maculés de jaune: v. *mediomaculatus*; ♀, ayant tous les segments, 2<sup>e</sup> excepté, marqués de jaune: v. *multiluteus*.

M. Pic.

## Additions à la Liste des Coléoptères et Hémiptères des environs de Clermont et des bords de l'Allier.

Par PAUL PIONNEAU

Par suite de nouvelles déterminations, nous pouvons ajouter, à la liste qui a paru dans cette Revue (1), les espèces suivantes.

Notre but n'est pas de donner ici une énumération d'espèces rares, mais seulement de faire connaître un aperçu de la faune de la région en signalant les espèces capturées dans nos promenades entomologiques.

*Cicindela campestris* L. ab. *cærulescens* Sch. — Mont-Dore, un exemplaire.

*Carabus problematicus* Hb.-l. var. *Arvernus* Lap. — Bois de la Pauze (environs de Clermont), assez commun.

*Bembidium Redtenbacheri* K. Dan. — Trois exemplaires pris à La Bourboule, au bord d'un ruisseau.

*Pogonus chalcus* var. *oceanicus* Dej. — Bord de l'Allier, assez rare.

*Harpalus honestus* Duft. — La Bourboule.

*Pterostichus femoratus* Dej. — La Bourboule (pas rare).

*Pterostichus pumilio* Dej. — Bois de sapins, route de Sancy, sous les pierres.

*Cantharis tristis* F. — Bords de l'Allier.

*Cantharis figurata* Mannh. — Lac de Guéret.

*Coccinella 10-punctata* L. var. *8-punctata* Müll. — Saillay.

*Myrrha 18-guttata* L. var. *silvicola* Ws. — Gravenoire.

*Halyzia 16-guttata* L. — Saillay.

*Aphidecta obliterated* L. ab. *fenestrata* Ws. — Mont-Dore, un exemplaire en battant les buissons.

*Eolito bius thoracicus* F. — Gravenoire.

*Atheta currax* Kr. — Saillay.

*Trichotichnus lævicollis* Duft. — Cascade du Plat-à-barbe.

*Agrilus roscidus* Kies. — Gravenoire.

*Cryptocephalus vittatus* F. — Assez commun, Saillay, etc.

*Otiorrhynchus tenebricosus*. Herbst. — Mont-Dore.

*Rhynchites germanicus* Herbst. — Gravenoire, commun.

*Cassida rubiginosa* Müll. — Saillay.

*Clytra 4-punctata* L. — Route du Sancy, au Mont-Dore.

*Hoplia cærulea* Drury. — Un seul exemplaire sur les bords de l'Allier, en juillet (2).

P. P.

(1) Voir l'*Echange*, n° 335, pages 83, 84 et 85. — N° 344, p. 159-160. — N° 348, p. 188-189. — N° 355, p. 53 et 54. — N° 377, p. 18, 19, 20.

(2) Voir « Notes de chasses », l'*Echange* n° 323, 1911.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

**Pachyteria Coomani** n. sp. Sat angustatus, nitidus, rufus, capite, scutello et infra corpore nigris, elytris apice late nigro-violaceis; antennis testaceis, ad basin rufis, elongatis, articulis 3 et sequentibus carinatis aut apice dentatis; thorace parum robusto, lateraliter tuberculato, lateraliter fortiter diverse, pro parte dense punctato; elytris ad basim parum latis, postice attenuatis, diverse punctatis, postice ad suturam impressis; pedibus rufis. Long. 26-28 mill. Tonkin (ex Père de Cooman). — Voisin de *speciosa* Pasc., en diffère par les antennes plus longues, les pattes rousses, etc.

**Pachyteria semiplicata** n. sp. Sat angustatus, postice valde attenuatus, parum nitidus, niger, capite rufo notato, articulis 1-9 antennarum, thorace, illo paulo nigro-notato, pedibus pro majore parte elytrisque ad basin late rufis, his apice nigro-opacis; thorace parum robusto, lateraliter tuberculato, irregulariter punctato et pro parte plicato; elytris diverse punctatis. Long. 30 mill. Tonkin. — Très distinct du précédent, en plus de la sculpture du prothorax, par les deux derniers articles des antennes noirs, le sommet des tibias et les tarses noirs, les élytres plus atténuées et non brillantes au sommet.

**Oxaxis unimaculata** n. sp. Parum elongatus, subopacus, griseo pubescens, niger, mandibulis, thorace, illo medio nigro notato, tibiisque pro parte testaceis; thorace parum breve, antice dilatato-rotundato, supra transverse depresso; elytris dense punctatis, ad suturam diverse testaceis aut albis. Long. 7,5-8 mill. Rép. Argentine (coll. Bruch et Pic). — A placer près de *cana* Chp. (1).

**Oxaxis unimaculata** v. nov. *trinotata*. Niger, thorace rufo, ad medium et lateraliter nigro notato, pedibus pro majore parte testaceis. Rép. Argentine.

**Oxaxis lineatithorax** n. sp. Angustatus, nitidus, elytris subopacis, griseo pubescens, testaceus, antennis pro parte, capite postice, thorace medio et lateraliter et infra corpore nigris, elytris nigris, late testaceo cinctis, in disco breve luteo lineatis. Long. 7 mill. Rép. Argentine. — Peut se placer près de *annulipes* Pic, tout autre par sa coloration, élytres moins densément ponctuées, etc.

**Daiphron polemioides** Kirsh. Je possède, de cette espèce très variable, les variétés suivantes, de Colombie ou Bolivie: v. *longilineatum*, à bandes noires très longues et élargies; v. *reductum*, à élytres noires maculées d'orangé aux épaules; v. *atripenne*, à élytres noires; v. *divisum*, à élytres orangées, et dessins noirs sur la base et le sommet; v. *obliteratum*, à élytres presque entièrement orangées, avec la suture en partie foncée.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) *O. cana* v. A Champ. (in *Biologia Cent. Am.* IV, 2, t. 7, f. 19). = *Championi* mhi.

## Bonne année et réflexions de circonstance

Après avoir souhaité, de façon brève, la bonne année à tous mes correspondants et abonnés de « *L'Echange* », je me permets, en guise de cadeaux de nouvel an, d'offrir quelques réflexions qui répondent en partie à certaines conceptions entomologiques jugées excessives.

Un collègue spécialiste étranger m'a écrit, en 1925, quelque chose dans ce genre: « On me conseille d'ignorer vos espèces publiées sous forme de diagnoses, cependant il me déplaît de le faire. » Qui donc donne de si bons conseils empreints de la plus franche cordialité, inspirés, non par un sentiment de jalousie, mais par le plus pur esprit scientifique? Je crois qu'il est préférable d'ignorer les noms de ces bons conseillers! Les nombreux types de la collection Pic doivent provoquer des insomnies regrettables qui troublent quelque peu la mentalité dite scientifique de certains entomologistes. Les remarquables esprits critiques qui conseillent aux spécialistes de *la dernière éclosion* de ne pas tenir compte des dénominations d'un plus ancien spécialiste, bref, qui poussent à mettre les *vieux types* de côté, ont la naïveté d'espérer qu'ils pourront ainsi supprimer la validité des insectes (ceux qu'ils ne possèdent pas surtout) qui leur sont inconnus. Même en entomologie, on a parfois des illusions remarquables! Et je me réjouis quelque peu, au lieu de me fâcher, en songeant que, par un intermédiaire (qui me les envoie pour de plus sûres déterminations), il m'arrive parfois d'étudier des insectes appartenant à des entomologistes qui s'estimeraient peu avertis en me les adressant directement. L'idée exposée dans la lettre citée ci-dessus aurait, d'autre part, été adoptée, si je m'en rapporte à une note récente (*Phil. Journ. Sc.* 31, 1926, p. 33), mais, au fond, cette note est-elle bien critique? Il semblerait plutôt qu'elle s'est glissée à cette place, comme une sorte d'excuse, pour tenter d'expliquer l'omission, dans un mémoire d'ensemble, d'une vingtaine d'espèces publiées. Ignorer des espèces, quel excellent système pour s'éviter des recherches bibliographiques, supprimer des déterminations parfois difficiles, mais est-il à recommander?

Un autre auteur, parce qu'un libraire étranger lui avait affirmé bénévolement que mes publications étaient *introuvables*, et qu'il l'avait cru avec la plus grande candeur, a (*absolument*, sinon scientifiquement) *ignoré* mes écrits pour publier; est-ce là encore un acte admirable, à conseiller, ou à imiter?

Je suis en bonnes relations avec divers auteurs spécialistes (n'ayant pas l'esprit jaloux, je les aide autant que possible plutôt que de critiquer leurs travaux, ce qui, cependant, me serait souvent facile), je ne crois pas cependant que ma complaisance suffise à tout excuser d'autre part. A côté de bons correspondants aux idées larges, il en est d'autres dont la personnalité un peu égoïste apporté bien des déceptions. Ainsi, pourquoi un collègue, que j'ai beaucoup aidé autrefois dans ses premiers pas de spécialiste, ne m'adresse-t-il même pas ses *separata* aujourd'hui, me forçant ainsi à faire de la copie, alors que mon temps pourrait être mieux employé autrement?

On gagnera plus à s'aider loyalement qu'à se chercher noise de différentes façons. Franche cordialité, aide et assistance (et non pas critique continue), voilà mon dernier souhait; il équivaut à un insecte rare et parfaitement intact.

LE DIRECTEUR DE L'ECHANGE.

---

## AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Ont payé, à la date du 1<sup>er</sup> février, leur abonnement pour l'année 1927: MM. Baker, Bernard, D<sup>r</sup> Bettinger, Commandant Carpentier, Collart, Corporaal, D<sup>r</sup> Dallas, Dayrem, Dufaut, D<sup>r</sup> Heyrovsky, Hicker, Klages, Lascols, Paul Nicod, Pionneau, de Touzalin.

L'envoi du journal est continué à tous les anciens abonnés; ceux qui ne refuseront pas le premier numéro seront considérés comme abonnés pour l'année courante. Prière d'envoyer, le plus tôt possible, le montant de l'abonnement, soit 7 ou 12 francs. Il ne sera pas fait de recouvrement par la poste, pour éviter les frais, aujourd'hui élevés.

Le Directeur de « **The New York Public Library** », 476, Fifth Avenue, **New York City**, demande, à ceux qui pourraient les lui procurer, les numéros 7 et 13, vol. 1, de *L'Echange*.

**M. J. Gazel, Villa Andrée, Vence** (Alpes-Maritimes), désire acheter œufs de **Saturnides** du Globe. — Faire offre.

**M. P. Sirguey, 28, rue James-Cane, à Tours**, offre en échange de nombreux coléoptères paléarctiques et surtout exotiques, ne faire offre qu'en espèces françaises. — Recherche de nombreux **Chrysomelidæ**, même communs, qui lui manquent.