

· L'ÉCHANGE  
**Revue Linnéenne**

FONDÉE PAR LE R JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (G. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodius paléarctiques, Histerides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacridés, Lathridiides.*

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coleoptères d'Europe, Melyridae, Plinidae, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidae, Cryptoceridae, etc du globe. — Cevamyelides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>). *Coleoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoïn

(16 Août 1927)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).

Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).

Sur quelques Rhopalocères paléarctiques, par Paul PIONNEAU.

Ichneumoniens nouveaux, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France: 7 francs. | Étranger: 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15 RUE D'ENGHIEN, 15

# ANNONCES

La page . . . . .	32 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	10 fr.
La 1/2 page . . . . .	18 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	6 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

---

*En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

---

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 1<sup>er</sup> août 1927, 49 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Payement à l'avance. Frais de port en plus.

---

## "Miscellanea Entomologica"

*Revue entomologique internationale*

---

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages) . . . . .	20 fr.
Edition réduite . . . . .	10 fr.
Annonces seules . . . . .	5 fr.

---

Direction et Rédaction: E. BARTHE  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

### Pour les déterminations

*Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.*

*Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

**Corymbites tessellatus** v. nov. **lineatus**. Elytris nigro-æneis, in disco rufo vittatis, pedibus pro parte rufis. Arleuf, en Morvan (Pic). — Variété caractérisée par les élytres ayant chacune une bande rousse allant des épaules presque à l'extrémité.

**Ernobius laticollis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, supra depressus et distincte granulatus, rufescens, elytris apice pallidioribus, abdomine obscuriore; antennarum articulis intermediis parum elongatis et paulo divergentibus, 9 et sequentibus paulo crassiusculis et longioribus; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato et valde marginato, supra postice inæquale et distincte impresso; scutello dense pubescente; élytris thorace non latioribus, elongatis, apice attenuatis, ad basin et ad suturam diverse impressis. Long. 6 mill. France, Mont-de-Marsan (coll. Pic). — Diffère de **Baudueri** Pic par la forme plus allongée, le prothorax plus large, la coloration moins foncée, et, à première vue, du variable **mollis** L. par les élytres déprimées et la structure du prothorax.

**Lasioderma semirufulum** v. nov. **Leveillei**. Coloration générale obscurcie avec les pattes testacées. Corse (coll. Pic).

**Dorcatoma Vaulogeri** n. sp. Subovatus, nitidus, irregulariter et hirsute griseo pubescens, rufus; elytris sat minute et sparse punctatis, externe bistriatis, striis fere uniformiter sulcatis, externe ad basin paulo impressis. Long. 2 mill. Algérie: Charéf (de Vauloger, in coll. Pic). — Voisin de **serra** Panz., en diffère, en outre de la coloration, par les élytres à ponctuation plus espacée, à stries plus régulières.

**Dorcatoma Dommeri** v. nov. **obscuricolor**. Subovatus, minute et sparse punctatus, irregulariter et hirsute albo pubescens, niger, thorace pro parte brunneo, membris rufis. Algérie: Teniet (coll. Pic). — Diffère, à première vue, de **Dommeri** Ros. par la coloration plus foncée de l'avant-corps.

**Dorcatoma bisulcata** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufescens, thorace medio obscuriore, irregulariter et hirsute griseo pubescens; elytris diverse, pro parte sat fortiter sed non dense, punctatis, externe bisulcatis, stria externa postice sat impressa, antice ad scutellum utrinque oblique et parum longe impressis. Long. 3 mill. Algérie: Tiaret (coll. Pic). — Voisin de **lanuginosa** Baud., et s'en distinguant facilement par ses élytres ornées de deux lignes impressionnées présuturales.

**Cantharis inculta** v. nov. **Leveillei**. Parum elongatus, capite rufo, postice nigro, elytris testaceis, membris pro majore parte nigris. Corse (coll. Pic).

**Cantharis pellucida** v. nov. **Croissandeaui**. Scutello rufo, pedibus testaceis, tibiis posticis ad basin supra paulo infuscatis. France: Orléans (coll. Croissandeau = coll. Pic).

**Cantharis lineata** v. nov. **Correai**. Elytris nigris, in disco antice reducte luteo lineatis. Portugal (coll. Pic).

**Rhagonycha notaticornis** (nov.). Angustatus, nitidus, sparse et hirsute griseo pubescens, testaceus, articulo 3° antennarum brunneo notato, oculis nigris, his prominulis; antennis gracilibus, sat elongatis, articulo 2° parum breve, 3° et sequentibus longioribus; thorace elongato, lateraliter sinuato, antice non attenuato et subarcuato, supra postice et externe impresso; elytris thorace paulo latioribus, parallelis, elongatis, minute granulato punctatis, subcostulatis; pedibus gracilibus, pilosis. Long. 10 mill. Pyrén. Luchon (coll. Pic). — Espèce caractérisée par la structure de son prothorax et le 3° article des antennes marqué de brun. Peut se placer près de *gracilis* Pand. qui ne m'est pas connu en nature et en différant au moins à titre de variété.

**Ceralliscus fulvus** Reitt. Varié : v. nov. *pectoralis* : rufo-testaceus, antennis apice pectoreque nigris; v. nov. *Moreli* : niger, elytris piceis, antennis ad basin pedibusque rufis; v. *rufithorax* : niger, thorace rufo, elytris late brunneis, antennis ad basin pedibusque testaceis. Transcaspienne (coll. Pic).

**Anthibates pallidonotatus** n. sp. Elongatus, nitidus, sericeo pubescens, testaceus, capite postice et infra corpore nigris, elytris nigris, antice testaceo lineatis et postice pallido maculatis; antennis brevibus, apice paulo crassioribus; thorace parum breve, antice arcuato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis. Long. 3,5-4 mill. Transcaspienne (coll. Pic). — Espèce distincte, à première vue, par ses élytres ornées postérieurement d'une macule flave. Parfois la coloration du dessous et de la tête est roussâtre, tandis que les dessins foncés s'oblitérent sur la base des élytres : v. nov. *reductus*.

**Orchesia fasciata** v. nov. *laterufa*. Supra late rufescens, elytris antice rufis, in disco piceo lineatis. Syrie (coll. Pic).

**Oberea pupillata** s.-esp. **Heyrovskyi**. Elongatus, parum robustus, rubro-testaceus, capite, antennis et infra corpore pro parte elytrisque nigris, his griseo pubescentibus et antice luteo notatis, thorace postice minute quadri nigro-maculato, coxis anticis supra nigro maculatis. Capite robusto, pro parte minute et dense, pro parte fortiter et sparse, punctato, medio minute sulcato; thorace breve et lato, inaequale punctato, medio postice paulo gibbuloso; elytris elongatis, apice paulo attenuatis et oblique truncatis, diverse sed distincte, pro parte regulariter, punctatis, punctis antice latioribus, apice fere indistinctis, ad basin externe et ad scutellum testaceo notatis, in disco sat longe et parum distincte luteo vittatis; infra corpore rufo-testaceo, pectore lateraliter nigro bilineato, abdomine medio diverse nigro notato, pygidio apice nigro marginato. Long. 20 mill. Ussuri : Satschan (communiqué par le D<sup>r</sup> L. Heyrovsky auquel cette race est dédiée). — Plus robuste que *O. pupillata* Gylh. avec le prothorax autrement maculé et les hanches postérieures marquées d'une petite tache noire. La maculature prothoracique noire, particulière entre toutes, est faite, de chaque côté, d'une macule postérieure réduite placée très près du bord externe, et d'une autre petite macule invisible du dessus, placée près des hanches antérieures.

**Strangalia 12-guttata** v. nov. *subobliterata*. Elytris nigris, minute quinque luteo maculatis : maculis 4 ad suturam longitudinaliter dispositis et macula externa antemediana. Sibérie (coll. Heyrovsky et Pic). — Se distingue de la forme type par la 2° macule externe oblitérée.

**Rhagium mordax** v. nov. *morvandicum*. Peu pubescent de gris, élytres à coloration foncière uniforme noire avec deux fascies, éloignées de la suture, et une bordure jaune très nette. Planches-en-Morvan (Pic).

**Polemius lyciformis** n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, nitidus, niger, thorace, illo nigro lineato, elytris que aurantiacis, his ad medium nigro fasciatis (forma typica), aut apice nigro maculatis et ad medium reducte et multi nigro notatis (v. nov. *interruptus*); antennis valde depressis; thorace parum breve, lateraliter sinuato; elytris elongatis, postice paulo dilatatis, fortiter costatis. Long. 12 mill. Bolivie. — Peut se placer près de *brevicornis* Kirsh.

**Discodon externenotatum** n. sp. Robustus, nitidus, niger, capite antice, thorace, illo medio nigro notato, coxis elytris que aurantiacis, his apice late nigro-maculatis, ad scutellum longe nigro notatis, ad medium externe minute nigro notatis, fere incostatis. Long. 9 mill. Brésil. — Voisin de *criollanum* Pic.

**D. castaneipenne** n. sp. Elongatus, nitidus, longe griseo pubescens, testaceus, oculis nigris, elytris castaneis; antennis gracilibus; thorace sat breve et parum lato. lateraliter sinuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, pro parte rugulosis. Long. 7 mill. Bolivie. — A placer près de *sangosium* Pic, prothorax moins robuste, élytres moins foncées, coloration de l'avant-corps plus pâle.

**D. cyaneipenne** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, rufus, antennis pro majeure parte, pectore, abdomine tarsisque nigris, elytris cyaneis. Long. 9 mill. Colombie. — Voisin de *bogotense* Pic.

Le **D. testaceitarse** mihi, de Bogota, très voisin du précédent, est entièrement testacé sauf les yeux noirs et les élytres d'un noir bleu, celles-ci sont très granuleuses et ont des traces de côtes discales.

Le **D. laticolle** mihi, de Bolivie, de coloration analogue au précédent, est plus robuste avec le prothorax plus transversal.

**D. tibiale** Pic. Sat elongatus, nitidus, rufus, antennis, femoribus 4 anticis apice, tibiis plus minusve, pectore abdomine que nigris; elytris cæruleis; antennis sat gracilibus; thorace breve et lato; elytris thorace non latioribus, subsinuatis, pro parte rugulosis, incostatis. Long. 9 mill. Pérou. — Voisin de *maculaticeps* Pic, mais tête non maculée, prothorax plus transversal, écusson roux.

**D. robustum** n. sp. Sat latus, nitidus, niger, antennis, capite thorace que rufis; antennis parum validis; thorace breve et lato, supra inæquale; elytris, thorace paulo latioribus, postice parum dilatatis, incostatis. Variat: capite thorace que nigro notatis (v. nov. *notaticolle*). Long. 12 mill. Pérou. — Voisin de *birubronotatum* Pic, mais avant-corps et antennes rousses.

**D. cephalotes** n. sp. Sat robustus, pro parte nitidus, niger, capite anticethorace que medio rufis, illo nigro cincto et in disco nigro bimaculato; capite valido, antennis sat gracilibus; thorace breve et lato; elytris thorace non latioribus, sat brevibus, lateraliter sinuatis, pro parte subopacis. Long. 9 mill. Brésil. — Voisin de *cinctithorax* Pic, tête plus grosse, élytres moins brillantes, prothorax bimaculé de noir sur le disque.

**D. bicoloricolle** n. sp. Sat elongatus, subparallelus, parum nitidus, elytris postice fere opacis, niger, capite antice thorace que lateraliter testaceis, illo medio rufo; antennis sat gracilibus; thorace breve et lato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, incostatis; abdomine lateraliter minute albo notato. Long. 8 mill. Equateur. — Moins robuste que *blumenausum* Pic, avec le prothorax plus clair sur les côtés, la tête noire.

**D. rufoscutum** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, capite pro parte, thorace scutelloque rufis; antennis sat gracilibus; thorace parum breve, sat lato, antice subarcuato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, elongatis, pro parte ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 9 mill. Brésil. — Voisin du précédent, mais prothorax concolore, écusson non foncé, etc.

Le **D. notaticeps** mihi, du Brésil, très voisin du précédent, d'une coloration analogue mais avec l'écusson noir, a la tête complètement noire postérieurement et subopaque, le prothorax plus transversal.

**D. Fryi** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace testaceo; capite sat lato, parum punctato; antennis gracilibus, elongatis; thorace parum breve, antice arcuato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, elongatis, pro parte distincte granulosis. Long. 10 mill. Brésil. — Diffère de *implicatum* Pic par les antennes concolores, les élytres plus longues, granuleuses.

**D. caucaense** v. nov. **Claveri**. Thorace in disco brunneo lineato. Colombie.

**D. cincticolle** n. sp. Parum elongatus, nitidus, capite antice, antennis ad basin et thorace circa diverse testaceis; antennis gracilibus; thorace subquadrato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, granulosis, distincte costulatis. Long. 8 mill. Colombie. — A placer près de *caucaense* Pic.

**D. Haenschi** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris viridi-metallicis, his parum punctatis; thorace breve et lato, marginato, lateraliter postice distincte inciso. Long. 8 mill. Equateur. — Voisin de *metallicum* Brg., s'en distingue par la structure du prothorax et les élytres vertes.

**D. santosense** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris cyaneis; antennis gracilibus; thorace parum breve, sat lato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, incostatis, pro parte rugulosis. Long. 7-8 mill. Brésil. — Voisin de *itatiyanum* Pic (*Telephorus olim*) et s'en distinguant, à première vue, par les pattes foncées.

**D. coxale** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris subcyaneis, antennis ad basin infra, capite antice, thorace lateraliter coxisque pro parte albis; antennis longissimis, parum gracilibus; thorace parum breve, sat lato, lateraliter sinuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, granulosis, incostatis. Long. 8 mill. Bolivie. — Voisin du précédent.

**D. meridanum** n. sp. Parum elongatus, nitidus, elytris opacis, niger, mandibulis, thorace, lateraliter medio excepto, flavis; antennis gracilibus; thorace sat breve, et lato, lateraliter sinuato; elytris thorace paulo latioribus, postice attenuatis, in disco bicostulatis. Long. 8 mill. Vénézuëla. — Espèce douteuse pour le genre, reconnaissable à son prothorax ayant une bande marginale claire, non complète, jointe à ses élytres costulées et mates.

**D. triangulare** n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufus, antennis pro majeure parte, thorace in disco, elytris, pectore medio et abdomine pro parte nigris; antennis gracilibus; thorace breve et lato, antice paulo attenuato; elytris thorace non latioribus, ad medium paulo dilatatis, rugulosis, incostatis. Long. 10 mill. Bolivie. — Ressemble à *annulaticorne* Pic, moins allongé et plus large, prothorax orné d'une tache triangulaire noire.

**D. Cinotaticeps** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, illo post oculos brunneo notato, thorace, scutello, coxis abdomineque pro parte rufis; antennis gracilibus; thorace sat breve et lato, antice arcuato, lateraliter subsinuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subsinuatis, rugulosis, fere incostulatis. Long. 13 mill. Bolivie. — A placer près de *Seilleri* Pic.

**D. socodosum** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-piceus, mandibulis femoribus, thorace lateraliter elytrisque ad suturam et lateraliter testaceis; antennis sat gracilibus; thorace breve et lato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, minute ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 8 mill. Brésil. — A placer près de *cinctum* Cast.

**D. basipenne** n. sp. Sat robustus, nitidus, niger, femoribus 4 anticis late rufis, supra rufus, elytris piceis, ad basin reducte rufis; antennis gracilibus; thorace breve et lato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, incostatis. Long. 10 mill. Colombie. — Espèce de coloration particulière, à placer près de *testaceicolle* Pic.

**Daiphron bilineaticeps** n. sp. Oblongus, opacus, niger, supra aurantiacus, capite inter oculos bi et postice uni nigro lineato, thorace medio nigro lineato, scutello nigro; antennis parum latis; thorace subquadrato; elytris costatis. Long. 8-9 mill. Colombie. — Voisin de *vicinum* Pic, plus robuste et autrement coloré; varie: le dessus du corps étant orangé concolore (v. *inlineatum*), ou les élytres noires avec les épaules brièvement rousses et prothorax non linéolé de noir (v. *humérale*),

**Chauliognathus annulipes** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite antice, scutello, infra corpore pro parte, femoribus et tibiis ad basin rufis, elytris ad humeros rufo maculatis, latis, subparallelis; antennis medio parum crassis; thorace breve, sat lato, antice arcuato, medio postice impresso. Long. 9 mill. Brésil. — Voisin de *exiguus* Gorh., plus large avec la coloration des élytres particulière, les pattes largement noires.

**C. carinaticollis** n. sp. Elongatus, niger, elytris apice sat late aurantiacis, antennis articulis 2 ultimis testaceis; thorace satis breve, antice arcuato, angulis posticis paulo prominulis, medio supra postice impresso et antice longe carinato. Long. 8-10 mill. Colombie. — Voisin de *phænicurus* Kirsh. mais coloration apicale des élytres orangée, au lieu d'être rougeâtre et prothorax caréné.

**C. imparallelus** n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, niger, antennis sat validis; thorace sat breve, antice arcuato, angulis posticis sat prominulis, medio postice sulcato. Long. 8 mill. Colombie. — Voisin de *aterrimus* Gorh., en diffère, à première vue, par les élytres élargies postérieurement et les yeux moins gros.

**C. parallelus** n. sp. Angustatus, parallelus, niger; antennis deplanatis; thorace breve, subsinuato, medio longe sulcato, angulis posticis sat prominulis. Long. 8 mill. Colombie. — Voisin du précédent, moins parallèle, antennes plus longues.

**C. particularicornis** n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, niger; antennis pectinatis; thorace sat elongato, lateraliter sinuato, angulis posticis paulo prominulis, medio postice longe sulcato; elytris alterne fortiter costulatis. Long. 11 mill. Colombie. — Distinct, à première vue, des autres espèces foncées par la structure de ses antennes.

**C. surinamensis** n. sp. Elongatus, opacus, niger, capite antice, thorace pedibusque

testaceis, humeris rufis ; thorace subquadrato, medio breve sulcato ; elytris elongatis, apice paulo attenuatis. Long. 8 mill. Surinam. — Voisin de *exiguus* Gorh., prothorax moins court, élytres mates, non bordées de clair.

*C. impressithorax* n. sp. Elongatus, parallelus, opacus, niger, elytris vage cyaneis, capite externe, thorace pedibusque pro majore parte testaceis, antennis gracilibus ; thorace breve et lato, medio late impresso et vage plicato ; elytris longissimis. Long. 8 mill. Pérou. — Voisin du précédent, élytres plus longues, à calus huméral noir, prothorax différent.

*C. sinuatithorax* n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, capite antice thorace, illo antice nigro marginato, femoribus infra, geniculis et infra corpore pro parte testaceis ; thorace transverso, medio late sulcato et vage plicato, antice et postice externe impresso, lateraliter sinuato. Long. 8 mill. Pérou. — Diffère du précédent, en plus de la structure du prothorax, par les élytres peu longues, débordées par les ailes, et d'un noir gris.

Le *plicatithorax* mihi, de Bolivie, très voisin du précédent s'en distingue par le repli huméral marqué de flave, le prothorax différent, moins large, triimpressionné en dessus avec 2 plis très nets séparés par une des impressions, les cuisses foncées.

*C. trinotatithorax* n. sp. Angustatus, opacus, testaceus, capite postice, antennis fere totis, tarsi pro parte, pygidio elytrisque nigris, thorace rufo, antice nigro marginato et postice nigro bilineato, illo subquadrato, supra sulcato et plicato. Long. 8 mill. Pérou. — Voisin des précédents.

Le *C. goyasensis* mihi, du Brésil, voisin des précédents, est un peu brillant, avec la tête plus grosse et le prothorax subcarré, testacé, impressionné sur son milieu postérieur, les pattes en majeure partie testacées, le dessous noir, taché de flave. On peut attribuer à cette espèce, comme variétés, les modifications suivantes, de la même provenance : Elytres testacées, largement marquées de noir à la base et au sommet, avec les pattes soit toutes, ou en majeure partie, claires (v. *pallidioripes*) ; soit foncées, avec la base des cuisses testacée (v. *obscuripes*) ; ou bien, avec les élytres entièrement foncées, tandis que les pattes sont noires (v. *atripes*). Rarement le prothorax est bordé de noir, sauf sur les côtés postérieurs, pour le reste analogue à la forme type (v. *interruptus*) et plus rarement encore la coloration générale est testacée avec la tête maculée de foncée (v. *notaticeps*).

*C. tocotoensis* n. sp. Elongatus, postice attenuatus, opacus, niger, capite pro parte, thorace lateraliter, et femoribus infra testaceis, corpore infra flavo cincto, elytris nigris, externe antice testaceo marginatis et post medium testaceo fasciatis ; thorace parum breve, medio longe sulcato ; elytris apice attenuatis. Long. 10 mill. Colombie. — Voisin de *curtelineatus* Pic et voisins, coloration élytrale particulière.

*C. diosensis* n. sp. Elongatus, postice attenuatus, subnitidus, aurantiacus, membris nigris, femoribus ad basin et infra rufis ; thorace parum transverso ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, minute punctatis. Long. 15 mill. Pérou. — Par sa forme voisin de *atricolor* Pic.



*Clytus rhamni* v. nov. *innormalis*. Elytres n'ayant pas de macule pubescente jaune près des épaules et par là très distincte de la forme type qui en possède une. Morée et Almissa (coll. Pic). — D'après le type (in coll. Pécoud), *Clytus* v. *bifasciatus* Nic. (1901) est synonyme de *C. lama* v. *vesubiensis* Pic (1900).

Aux variétés déjà nommées de *Cryptocephalus 10-maculatus* L., voisines de ma var. *externesignata*, on peut ajouter les trois suivantes que j'ai recueillies en Morvan. Elytres noires marquées de jaune, soit près de l'écusson (v. *miscerus*), soit vers l'extrémité seulement (v. *Goulettei*), soit vers l'écusson et aussi près de l'extrémité (v. *Prixii*). — Dans la même espèce, sont encore à distinguer les variétés suivantes, de ma collection : var. *gardanus*, du Gard, ayant les macules externes, puis les macules internes, noires, conjointement jointes ; var. *teutonicus*, ayant les macules postérieures jointes, et var. *germanicus*, ayant les macules antérieures jointes, sur chaque élytre, celles-ci d'Allemagne ; v. *Marionensis* Pic. des Guerreaux, ayant les macules médianes toutes jointes et formant une bande irrégulière noire.

(A suivre.)

M. PIC.

## Sur quelques Rhopalocères Paléarctiques

PAR PAUL PIONNEAU

(Suite)

QUATRIÈME NOTICE

20. *Anthocaris Cardamines* L. var. *Britannica* Vrtz. — D'après l'auteur de cette variété, tous les échantillons volant en Angleterre doivent porter ce nom. Le principal caractère est le suivant. Le limbe apical noirâtre descend jusqu'à l'angle interne (*Oberthür*, III, p. 139). Or, tous les sujets que l'on rencontre sur le territoire de la Grande-Bretagne ne présentent pas cette disposition, mais étant en tous points conformes à *Cardamines* Linnée, doivent être regardés comme typiques. On rencontre aussi dans diverses régions de la France la forme *Britannica* Vrtz, mélangée avec le type.

21. *Anthocaris Euphenoides* Stgr. ab. *minima* nov. ab. (1). — Exemplaires de petites dimensions, 28 à 29 mill. d'envergure. Le type varie de 35 à 40 mill.

Deux échantillons provenant des environs de Digne (Basses-Alpes).

22. *Melanargia Galathea* L. ab. *minor* nov. ab. — Se distingue de l'espèce typique par sa petite taille mesurant environ 35 mill. d'envergure. Un exemplaire ♂ capturé à Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) et se rapportant à la var. *Serrana* Vrtz, qui est la race du Nord de la France à taches noires très réduites.

OBSERVATIONS. — Ne pas confondre cette forme avec la petite race ou var. *Montana* Vrtz, d'Italie, qui s'en éloigne en ce que les taches noires sont très étendues, quoique d'une manière générale celle-ci forme transition entre la forme dite *Procida* Herbst, et *Florentina* Vrtz.

(1) Cette forme, dans la liste de Staudinger est indiquée sous le nom de *Minor*, mais, sans nom d'auteur.

23. *Everes Coretas* Och. ab. *Ornata* nov. ab. — Cette aberration se distingue du type par un semis d'atomes bleuâtres à la base des ailes supérieures. Un échantillon ♀ bien caractérisé pris par nous à Villenave-d'Ornon (Gironde), en juillet 1923.

24. *Thecla W-Album* Knoch. ab. *minor* nov. ab. — Nous basons la description de cette nouveauté sur un petit exemplaire présentant 23 mill. d'envergure. Le sujet fait partie de notre collection. Il a été capturé à Saint-Côme (Gironde) par M. l'abbé Sorin. (Le type est ordinairement de 27 à 32 mill., quelquefois 25).

25. Rectifications sur *Satyros Fidia* L. var. *Veilleia* Frusth. — Nous croyons utile et indispensable de revenir sur ce sujet. Contrairement à nos premières observations (voir l'*Echange*, n° 420, année 1925, p. 7), et après une nouvelle et sérieuse étude de cette race, nous devons reconnaître que celle-ci a une certaine valeur. Intermédiaire entre la race du Sud de l'Espagne et celle de France, elle est généralement nettement plus petite et d'un noir beaucoup plus profond en dessus, mais le dessous, comme nous avons déjà pris soin de le faire observer, est absolument identique à la race des Pyrénées-Orientales, que nous devons regarder désormais comme typique, étant à peu près semblable au vrai type de Provence, dont il n'est guère utile de la séparer (1). Nous pouvons ajouter que la var. *Monticola* Thierry-Mieg., moins chargée de noir en dessous, quoique se rencontrant moins abondamment, reste spéciale aux Pyrénées-Orientales. Conclusion : La race d'Aragon mérite d'être séparée sous le nom de *Veilleia* Frusth.

(A suivre.)

## Ichneumoniens nouveaux [Hym.]

*Ichneumon sugillatorius* v. nov. *Prixii*. ♂. Abdomen à segments 1 à 3 maculés de blanc de chaque côté. Forêt de Saint-Prix, en Morvan (Th. Pic). — Intermédiaire entre la forme type et la var. *modicenotatus* Pic.

*Ichneumon Mequignoni* n. sp. ♂. Elongatus, niger, antennis infra pedibusque pro majore parte rufis aut luteis; abdomine sublanceolato, nigro, segmentis 2<sup>e</sup> sat late luteo et ad basin minute rufo notato, 6<sup>e</sup> supra albo maculato.

Allongé avec l'abdomen sublancéolé, noir avec le dessous des antennes roux, les pattes en partie rousses et jaunes avec la majeure partie des cuisses postérieures, le sommet des tibias postérieurs et l'extrémité des tarsi noirs, abdomen largement noir. Antennes peu robustes, atténuées à l'extrémité, tête toute noire ainsi que le thorax; aréole supéro-médiane transversale, ruguleuse; postpétiole très élargi en arrière et un peu tuberculé latéralement, rugueux, gastrocèles grands, intervalles en partie rugueux, 2<sup>e</sup> segment à moitié jaune, 3<sup>e</sup> un peu transversal, en majeure partie noir, derniers noirs avec le 6<sup>e</sup> seul maculé de blanc, 4<sup>e</sup> caréné en dessous; ailes ordinaires, stigma fauve. Long. 15 mill. Arleuf, en Morvan (Pic). Dédié au professeur Mequignon, qui est, je crois, le premier ayant chassé à Arleuf. — A placer près de *gracilicornis* Grav., dont il diffère, à première vue, par la forme et la sculpture du postpétiole, les gastrocèles plus étroits.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) Ayant comparé une petite série des deux régions, il n'y a aucun doute sur ce point.

# Société Entomologique Argentine

**ADRESSE : Rue Bernardo de Irigoyen, 331, Musée national d'histoire naturelle, Buenos-Ayres, Argentine. Sud America.**

Président : D<sup>r</sup> E.-D. DALLAS.

Vice-Président : M. Albert BREYER.

Secrétaires : MM. R. STRASSBERGER, R.-N. ORFILA et prof. E.-A. DEAUTIER.

Trésorier : M. Fritz NOSSWITZ.

Bibliothécaire : Prof. J. DE CARLO.

Institut : Ing. Paul KOEHLER.

**Séances mensuelles. — Publications : Revue et Bulletin**

## AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Les abonnés de l'*Echange* qui recevront le présent numéro sont ceux ayant payé leur abonnement pour l'année courante. Quelques retardataires, qui ne sont pas en règle, ne seront pas surpris de ne rien recevoir et ne devront pas croire que le journal a cessé de paraître. Il est désirable que tout le monde comprenne que la tâche d'un directeur de publication scientifique est souvent ingrate et qu'il n'est pas agréable pour lui, soit de rappeler des retardataires à l'ordre, soit de faire des frais pour le recouvrement d'abonnements en retard.

Le Directeur de l'*Echange* ayant encore quelques lots importants d'insectes à déterminer, prie ses correspondants d'attendre patiemment le retour de ceux-ci avant de lui adresser de nouveaux envois. Jusqu'à nouvel ordre, il demande qu'on lui adresse seulement de petits envois par la poste, afin de lui permettre de se mettre à jour. Il est rappelé que tous les frais d'envoi ou de correspondance doivent être supportés, non par le déterminateur, mais par ceux qui communiquent.

Pour éviter des abus, il ne sera pas répondu dorénavant aux demandes qui ne seront pas accompagnées des timbres nécessaires pour assurer la correspondance en retour.

M. Maurice Pic, à Digoin, ou Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire) est désireux d'acquérir, plutôt que d'échanger, des Coléoptères paléarctiques rares ou exotiques, même indéterminés, rentrant dans les familles suivantes: Scaphidiidæ et voisins, Dermestidæ, Anobiidæ, Ptinidæ, Cleridæ, Malacodermes (divers), Hétéromères (surtout non Mélasames), Bruchidæ, Cerambycidæ et Phytophages (divers).

Désire aussi en échange des Hyménoptères paléarctiques, en *Ichneumonien*s ou *Tenthredinidæ* seulement.

Offre en échange des Coléoptères du globe, dont un certain nombre de co-types, et des Hyménoptères de la Faune paléarctique.

---

## NOTES DE CHASSES

M. E. Roman a capturé à Lyon (Faculté des Sciences), le 4 mai 1927, un *Nemosoma*, pouvant se rapporter à *cornutum* Sturm comme exemplaire anormal, avec 11 articles aux antennes.

M. E. Audras a capturé: *Semiadalia rufocincta* Muls. à Pralognan (Savoie) et *Ernobius angusticollis* Rats. à Saint-Rambert (Ain).

M. et M<sup>me</sup> M. Pic ont capturé dans la Nièvre, à la fin de juin dernier:

1<sup>o</sup> aux abords du Lac des Settons: *Bombidion modestum* Panz. et *tibiale* Duft.; *Platynus marginatus* L.; *Poederus ruficollis* F.; *Corymbetes purpureus* Poda; *Limonius æruginosus* Ol.; *Denticollis linearis* L.; *Cantharis fulvicollis* F., *Podabrus alpinus* v. *Mocquerysi* Reiche; *Rhagonycha translucida* Kryn., *Sinodendron cylindricum* L., *Orchesia unäulata* Kr., *Pyrochroa serraticornis* Scop., *Rhagium bifasciatum* F., *Asemum striatum* L., *Stenostola ferrea* L., *Cryptocephalus 8-punctatus* Scop., *6-punctatus* L., etc.

2<sup>o</sup> A Planchet et environs: *Necrophorus vespilloides* Herbst, *Melanotus rufipes* Herbst, *Althous hirtus* Herbst, *Opilo domesticus* Panz., *Cantharis violacea* var. *innotaticeps* Pic, *Sytocerus caraboides* L., *Melandrya caraboides* L., *Oedemera tristis* Sch., *Rhychites Manerheimi* Hum. et *nanus* Payk., *Cyphus nitens* Scop., etc.