

# L'ÉCHAQUE Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (M. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodius paléarctiques, Histerides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erolytides, Phalacrides, Lathridiides.*

Maurice Pic, Digoin (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Molyridae, Ptilidae, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidae, Crioceridae, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptoccephalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>)  
*Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Digoin

(12 Février 1928)

## SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).

Sur quelques Rhopalocères paléarctiques, par Paul PIONNEAU (suite). — (5<sup>e</sup> notice).

Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France: 7 francs. | Étranger: 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN, 15

# ANNONCES

La page . . . . .	32 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	10 fr.
La 1/2 page . . . . .	18 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.) les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

---

## EN VENTE

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'Echange, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° Mélanges Exotico-Entomologiques, qui comprennent, à la date du 14 octobre 1927 50 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Paiement à l'avance. Frais de port en plus.

---

## "Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

---

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages) . . . . .	20 fr.
Edition réduite . . . . .	10 fr.
Annonces seules . . . . .	5 fr.

---

Direction et Rédaction: E. BARTHE  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

### Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire!

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

**Corrigenda.** Pour avoir mal lu l'étiquette de la localité, j'ai décrit, dans le dernier *Echange*, deux Malacodermes comme originaires de l'île de Capri, c'est une erreur ; M. Mancini, qui les a découverts, vient de m'informer qu'ils proviennent de l'île de Capraia (île de l'archipel Toscan, située près de la Corse), presque inconnue au point de vue entomologique.

Avec *Staphylinus cæsareus* Ced. on trouve en France le *S. parumtomentosus* Stein., espèce méconnue (1) et confondue. J'ai capturé cette dernière espèce aux Guerreaux et à la Grande Chartreuse, et je possède la première de la Grande Chartreuse (ex D<sup>r</sup> Jacques) et d'Autun (ex Fauconnet), mais ne me souviens pas de l'avoir recueillie moi-même. Le *S. parumtomentosus* Stein. pourra se distinguer du *cæsareus* Ced. par les tempes revêtues de pubescence foncée (et non dorée), le prothorax plus étroit que les élytres (et non de même largeur), et paraissant entièrement mat (il est un peu brillant sur le disque chez *cæsareus* Ced.). — Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le *S. parumtomentosus* Stein., paraît plus commun en France que le *cæsareus* Ced.

**Lampyroidea Tenenbaumi** n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, capite nigro, thorace rufo-testaceo, medio diverse piceo notato ; elytris nigro-piceis, pro parte testaceo marginatis, autennis brunneis, aliquot pro parte testaceis. Forme étroite avec le prothorax nettement plus étroit que les élytres qui sont longues ; tête un peu creusée entre les yeux, fortement ponctuée, plus étroite que le prothorax, celui-ci bicolore, court et large, peu élargi en avant, presque droit latéralement, étroitement rebordé sur les côtés, subsilloné sur le milieu du disque, fortement et densément ponctué ; écusson testacé ; élytres longues, nettement plus larges que le prothorax, foncées, en partie et étroitement bordées de clair, ornées d'une pubescence courte en partie redressée, ruguleusement ponctuées ; dessous du corps et pattes d'ordinaire entièrement testacés, abdomen parfois en partie foncé, deux derniers segments blanc de cire. Long. 7-8 mill. Palestine : Ben Schemen (Tenenbaum, in coll. Tenenbaum et Pic). — Voisin de *nigrescens* E. Ol., en diffère par les élytres plus foncées, à bordure claire, la forme plus allongée.

**Malachius latenotatus** n. sp. ♀ Parum elongatus, nitidus, fere glaber, viridi-metallicus, capite antice, thorace antice et lateraliter late elytrisque apice luteis ; capite sat robusto, inter oculos transverse sulcato, articulis 2-4 antennarum brevibus et dilatatis, 5 et sequentibus elongatis, obconicis ; thorace sat breve et lato, posticc

(1) Consulter Sainte-Claire-Deville, in *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1927, p. 57, 58.

externe late marginato ; elytris thorace indistincte latioribus, parum elongatis ; tibiis posticis paulo curvatis. Long. 8 mill. Maroc (coll. Pic). Distinct, à première vue, des autres *Malachii decorati* par le prothorax largement marqué de jaune sur ses angles antérieurs.

*Malthinus (Progentes) validiceps* n. sp. Elongatus, subnitidus, rufus, aut testaceus, abdomine supra paulo et tibiis posticis pro parte nigro-piceis, thorace valde latiore ; capite valido, antice pallidiore, postice medio impresso, oculis prominulis ; thorace parum breve, non angustato, lateraliter subarcuato, angulis posticis prominulis, supra postice medio sulcato ; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, griseo-testaceis ; abdomine prominulo, pro parte nigro-piceo, pygidio testaceo. Long. 4 mill. Perse (coll. Pic). — Très distinct par sa coloration générale pâle ; peut se placer près de *Drurei* Pic.

*Hylophilus corcicus* n. sp. Oblongus, nitidus, sparse non hirsute griseo pubescens, rufescens, oculis nigris, membris testaceis ; capite thorace valde latiore, fortiter sat dense punctato, oculis grandis, prominulis, valde distantibus ; antennis intus oculos insertis, sat elongatis, subfiliformibus, articulo 2<sup>o</sup> breve, globuloso, 3<sup>o</sup> elongato, sequentibus elongatis, ultimo elongato apice subacuminato ; thorace breve et lato, dense ruguloso-punctato, lateraliter recto, angulis anticis nullis, ad basin transverse et valde impresso ; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, apice paulo attenuatis, fortiter sat sparse punctatis, ad basin non distincte impressis ; pedibus gracilibus. Long. 2 mill. environ. Corse (coll. Pic). — Cette intéressante espèce, très distincte à première vue des autres espèces paléarctiques, par la tête très grosse, la structure du prothorax ou des antennes, se trouvait dans la collection Croissandeau (famille des *Anthicidæ*, acquise par moi chez Clermont), sous le nom, évidemment erroné, de *H. minor* Baudi. Je ne connais pas *H. minor* Baudi autrement que par la description qui lui donne entre autres caractères : « l'avant-corps obsolètement ponctué et les antennes épaissies aux extrémités », ce qui ne convient pas à mon espèce. — Peut se placer provisoirement dans mon sous-genre *Pseudanidorus*.

*Anthicus fenestratus* v. nov. Fauconneti. Capite thoraceque rufescentibus. France M<sup>le</sup> et Algérie (coll. Pic).

*Anthicus fumosus* v. nov. sardiniensis. Rufescens, membris elytrisque pallidioribus, ad medium vage rufo notatis. Sardaigne (coll. Pic).

*Brachyta Solsky* v. nov. discobilineata. Elytris luteis, ad scutellum uni et externe multi et diverse nigro maculatis, in disco medio nigro bilineatis, lineis antice et postice junctis. Sibérie : Sajan (coll. Heyrovsky). — Variété voisine de la v. *multisignata* Pic, caractérisée surtout par les deux linéoles noires du disque des élytres. Je possède un exemplaire pouvant se rapporter à la même variété dont les dessins noirs sont plus étendus et couvrent notamment la base des élytres en se réunissant à la première macule humérale externe.

Le type unique de *Rosalia alpina* v. *Croissandeaui* Pic figure maintenant dans ma collection.

(A suivre.)

M. Pic.

**Photinomorpha Championi** n. sp. Oblongus, sat latus, postice attenuatus, niger, thorace late testaceo-marginato. Mexique. — C'est l'insecte figuré au n° 6 de la planche III (in Trans. Ent. Soc. Lond. 1915) et que je ne connais pas en nature.

**Cladophorus leonensis** n. sp. Elongatus, minutus, niger, antennis apice, femoribus ad basin, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice minute nigro-notatis; antennis depressis, longe pectinatis; thorace 5 areolato, parum lato, antice arcuato, angulis posticis prominulis; elytris irregulariter fenestrato-punctatis. Long. 6 mill. Sierra-Leone. — Espèce caractérisée par sa petite taille et la coloration en partie claire des membres.

**Cl. curticornis**. n. sp. Elongatus, opacus, niger, thorace, illo postice medio nigro, elytrisque aurantiacis, his apice sat late nigro-notatis; antennis depressis, dentatis, brevibus; thorace 7 areolato, parum lato, antice sinuato, lateraliter distincte strangulato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, parallelis, sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 12 mill. Erythrée. — Peut se placer près de *coarcticollis* Brg.

**Cl. nigricornis** n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice mediocre nigro-notatis; antennis subflabellatis ♂, aut latis et dentatis ♀; thorace sat elongato ♂, aut parum lato ♀, antice subarcuato, angulis posticis prominulis, medio postice areolato et antice carinato; elytris subparallelis, sat angustatis, sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 8-9 mill. Afrique: Ouganda. — Espèce caractérisée par la structure de son prothorax, sans doute voisine de *linearis* F.

Le **C. apicicornis** mihi, de l'Ouganda, voisin du précédent (sexe ♀) par la structure uniaréolée de son prothorax, mais avec cet organe un peu moins large, en diffère par les antennes marquées de testacé à leur base et à leur extrémité, les hanches non foncées.

Le **C. inæqualis** mihi, du Cameroun, également voisin de *atricornis mihi* par son prothorax uniaréolé, s'en distingue (ex. ♂) par cet organe un peu sinué en avant avec les angles postérieurs moins prolongés et surtout par le grillagé très inégal des élytres, les intervalles fortement plissés en travers.

**Cl. anormalis** n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter, elytris, his apice breve nigro-notatis, coxis femoribusque ad basin breve aurantiacis; antennis valde depressis, longe pectinatis; thorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis prominulis, medio postice areolato et antice carinato; elytris elongatis, 4 costatis, intervallis diverse fenestrato-punctatis, 4<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup> medio uni et parte irregulariter fenestratis. Long. 6 mill. Ouganda. — Espèce distincte, à première vue, des précédentes et des autres anciennes, par le grillagé non uniforme des élytres en partie double, en partie simple, sur les intervalles.

**Cl. nigrithorax** n. sp. Elongatus, opacus, niger, antennis ad basin elytrisque testaceis, his apice late nigris; antennis depressis, longe pectinatis; thorace parum lato, 7 areolato, antice medio arcuato, lateraliter fere recto, angulis posticis fere rectis; elytris parum regulariter fenestrato-punctatis. Long. 8 mill. Natal. — Diffère, à première vue, de *natalensis* Brg. par le prothorax plus robuste, entièrement noir et les élytres moins largement noires.

**Cl. notaticeps** n. sp. Elongatus, opacus, niger, capite medio, antennis apice, femoribus ad basin, pectore, thorace, scutello elytrisque testaceis, his apice nigro-notatis;

antennis depressis, longe pectinatis; thorace parum lato, antice medio paulo prominulo, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, parum distincte 5 areolato; elytris sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 8 mill. Gabon. — Voisin de *maculatipes* Pic, prothorax moins large, élytres plus parallèles, coloration différente.

**Cautires minimus** n. sp. Angustatus, subnitidus, niger, antennis apice, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his apice late nigris; antennis parum latis, sublabel-latis ♂; thorace parum lato, antice arcuato, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, supra medio postice elongato-areolato et antice carinato; elytris sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 6 mill. Cameroun. — Voisin de *diversithorax* Pic, très distinct par sa petite taille, ses antennes plus grêles, l'aréole du prothorax moins longue.

**Anthocomus brasiliensis** v. nov. Bruchi. Capite thoraceque late rufescentibus, pedibus late nigris. Rép. Argentine (coll. Bruch et Pic). — La forme type a l'avant-corps presque entièrement foncé et les pattes plus claires.

**Dromanthus minutus** n. sp. Oblongo-elongatus, minutus, nitidus, parum pubescens, niger, thorace postice rufo, elytris nigro-cæruleis, minute et parum dense punctatis, ad suturam impressis; capite elongato; thorace sat breve. Long. 3 mill. Rép. Argentine (coll. Bruch et Pic). — Espèce distincte entre toutes par sa petite taille et le prothorax largement bordé de roux postérieurement.

**Semijulistus bicoloripes** n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, subopacus, elytris nitidis, niger, epipleuris pedibusque rufis, femoribus medio brunneis; capite thoraceque dense punctatis; articulis 5 et sequentibus antennarum pectinatis; elytris apice attenuatis, fortiter sat sparse punctatis, epipleuris reductis. Long. 5 mill. Amérique Sep<sup>le</sup>. — Diffère de *callosus* Sols. par les élytres moins larges par rapport au prothorax, celui-ci fortement crénelé avec les pattes plus claires. — Je ne connais aucun représentant décrit de ce genre pour l'Amérique S<sup>le</sup>. Il se pourrait que le genre *Eurelymis* Casey se confonde avec le genre *Semijulistus* Sols.

**S. rubrithorax** n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, niger, capite antice, thorace, scutello, antennis ad basin pedibusque rubro-testaceis. Long. 4. mill. Amérique S<sup>le</sup>: Mariposa. — Très distinct du précédent par sa coloration.

**Mauroniscus maculatus** v. nov. junctus. Les macules jaunes des élytres sont agrandies et jointes. Rép. Argentine (coll. Bruch et Pic).

**Plectonotum violaceipenne** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris violaceis; thorace marginato, antice lateraliter paulo plicato; elytris diverse pro parte dense punctatis. Long. 10 mill. Rép. Argentine. — Espèce distincte entre toutes par sa particulière coloration.

**P. nitidum** n. sp. Sat angustatus, nitidus, fere glaber, niger, antennis ad basin, capite, thorace, scutello geniculisque rufis aut testaceis; elytris nigris, tenuiter albo marginatis. Long. 10 mill. Rép. Argentine. — Voisin de *albocinctum* Pic, en diffère par la forme moins allongée, les pattes plus foncées, le dessus presque glabre.

**Plectocephalon** n. gen. Antennis filiformibus; capite robusto, postice arcuato, oculis minutis; thorace breve et lato, lateraliter explanato, antice attenuato, medio arcuato inciso. — Ce nouveau genre de *Cantharidæ*, pouvant prendre place près de

*Plectonotum* Gorb., se reconnaîtra, à première vue, par sa grosse tête et son prothorax fortement incisé sur son milieu antérieur.

*Plectocephalon testaceum* n. sp. Elongatus, subparallelus, parum pubescens, nitidus, testaceus, capite pro parte rufo, oculis et infra corpore nigris. Long. 8 mill. Amérique M<sup>ie</sup> : Gobi.

*Maronius Gorhami* n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin infra, thorace, scutello, femoribus ad basin abdomineque pro parte testaceis, elytris apice luteis; antennis elongatis, articulis pro parte impressis, paulo depressis; thorace paulum elongato, apice attenuato, medio subelevato; elytris sat latis et brevibus, apice dehiscentibus, externe longitudinaliter plicatis, parum nitidis, minute punctatis. Long. 10 mill. Amérique M<sup>ie</sup>. — Voisin de *pulcher* Pic, antennes moins grêles, élytres moins brillantes et marquées de jaune au sommet.

*M. huallaganus* n. sp. Elongatus, nitidus, antennis ad basin infra et apice thorace, scutello, femoribus ad basin abdomineque pro parte testaceis, elytris apice luteis. Long. 9 mill. Pérou. — Voisin du précédent, en diffère par les antennes un peu larges et aplaties à partir du 4<sup>e</sup> article, les élytres plus longues marquées d'un pli à leur sommet.

Le *M. apicicornis* mihi, du Pérou, voisin et de coloration analogue au précédent, mais avec les pattes testacées sauf partie des cuisses postérieures, en diffère par les antennes grêles à sommet noir, les élytres presque mates, plus courtes et plus larges.

*Belotus Hogeï* n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, capite postice elytrisque piceis, his apice luteis, thorace medio aut antice paulo brunnescente; thorace sat breve et lato, medio diverse impresso; elytris latis, et brevibus, apice impressis, postice dehiscentibus; pedibus testaceis, aliquot pro parte brunneis. Long. 5 mill. Mexique. — A placer près de *abdominalis* Lec.

*Tylocerus bilineatus* n. sp. Subparallelus, parum nitidus, testaceus, elytris nigris, in disco testaceo lineatis, ad suturam et externe testaceo, marginatis, antennis nigris, articulis ad basin rufis, pedibus testaceis, geniculis tibiisque ad basin diverse nigris; capite robusto; articulo 1<sup>o</sup> antennarum sat robusto et elongato; thorace breve et lato, sinuato, marginato, in disco medio impresso. Long. 9-10 mill. Guadeloupe. — Voisin de *lineatus* Gorb., en diffère par la tête concolore et les élytres moins largement foncées.

*Malthinus atripennis* v. nov. griseopubens. Niger, griseo pubescens, subopacus, capite infra oculos, antennis ad basin et abdomine circa testaceis, thorace testaceo, medio nigro vittato, medio sulcato et postice impresso. Long. 7 mill. Chine. — Plus pubescent que *atripennis* Pic, avec le prothorax moins étroit et plus largement testacé.

*Rhagonycha nigricoloriceps* n. sp. Elongatus, nitidus, elytris subopacis, niger, antennis ad basin, palpis, mandibulis, thorace pedibusque anticis pro parte testaceis; capite sat elongato; thorace elongato, lateraliter subsinuato, marginato, postice medio impresso; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, ruguloso-punctatis, subcostulatis. Long. 9-10 mill. Chine. — Voisin de *obscuripes* Pic, en diffère par la tête foncée, les élytres moins étroites, etc.

*Discodon Wagneri* n. sp. Subparallelus, sat elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, antennis, capite pro parte, tarsis abdomine pro parte, elytrisque, in disco nigris

aut piceis, capite antice rufo, thorace testaceo, in disco reducte piceo bilineato. Long. 9 mill. Rép. Argentine. — A placer près de *photinoides* Gorh., coloration différente.

**D. bahianum** n. sp. Subparallelus, sat elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, pedibus pro parte et thorace lateraliter late testaceis, elytris nigris aut piceis, lateraliter et ad suturam flavo marginatis. Long. 9-10 mill. Brésil. — Diffère du précédent par le prothorax plus transversal, largement noir au milieu.

**D. Boneuili** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace, medio vage rufescente, elytris testaceis; thorace breve, et luteo, marginato, lateraliter sinuato, in disco inæquale impresso; elytris thorace paulo latioribus, longis, subparallelis. Long. 8 mill. Bogota. — Plus allongé que *columbianum* Pic, avec les élytres testacées.

**D. violaceipenne** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris violaceis; thorace sat elongato, lateraliter sinuato, externe vage rufo-notato; elytris thorace sat latioribus, longis, subparallelis. Long. 9 mill. Bolivie. — Espèce de coloration particulière, pouvant se placer près de *metallicum* Brg.

**Chauliognathus pallens** Bl. Je rapporte à cette espèce, comme variétés des insectes à forme élytrale plus allongée que *inspinosus* Pic, et sans granules distinctes, à prothorax concolore, mais tête d'ordinaire maculée de foncé, ayant, soit une petite macule postmédiane foncée (var. nov. *maculatipennis*), soit deux macules juxtaposées (var. nov. *binotatus*) (coll. Hicker et Pic). Brésil.

J'attribue à **C. maschilostictus** Berg., comme variété, des insectes oblongs en partie et peu brillants, roux avec les antennes largement et les tarses noirs, ayant parfois la tête et le prothorax marqués de foncé; ces insectes sont bien caractérisés par la présence, sur les élytres, d'un pli dorsal antérieur assez long, flanqué intérieurement d'un sillon un peu oblique par les élytres non concolores mais diversement (étroitement ou largement) marquées de noir après le milieu. Je les désigne sous le nom de v. *sulcatipennis*. Brésil (coll. Hicker et Pic).

**C. latetrinotatus** n. sp. Oblongus, pro parte opacus, late niger et testaceo notatus, thorace nigro, testaceo limbato, illo breve et lato, medio opaco, lateraliter granuloso; elytris testaceis, ad basin late nigris et post medium, in singulo, nigro maculatis, his sat brevibus, ad medium dilatatis, postice attenuatis, apice oblique truncatis, sparse et diverse punctatis, opacis, ad basin paulo nitidis. Long. 12 mill. Brésil. — Voisin de *submaculatus* Pic, élytres moins allongées, prothorax plus rétréci en avant, coloration différente.

**C. subplicatus** n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, rufus aut testaceus, capite et infra corpore pro parte, antennis tarsisque nigris, elytris post medium undulato nigro fasciatis et apice nitido plicatis, sat dense punctatis. Long. 15 mill. Brésil. — A placer près de *fallax* Germ., caractérisé par la plicature brillante du sommet des élytres.

**C. diosensis** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, subnitidus, aurantiacus, membris nigris, femoribus ad basin et infra rufis; thorace parum transverso; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, minute punctatis. Long. 15 mill. Pérou. — Par sa forme voisin de *atricolor* Pic.



## Sur quelques Rhopalocères Paléarctiques

Par PAUL PIONNEAU

### CINQUIÈME NOTICE

27. **Erratum.** — Dans l'*Echange* n° 429, 1927, page 11, au sujet de *Melanargia Galathea* L. ab. *minor*, au lieu de var. *Serrana* Vrty, lire var. *Serena* Vrty.

28. *Pieris Brassicæ* L. ab. *Separata*. nov. ab. — Se distingue du type par la deuxième macule des ailes supérieures en dessous qui est divisée en deux parties bien distinctes. Cette aberration peut se rencontrer partout, mais paraît peu commune. Un exemplaire ♂ provenant de Sicile, sans indication de localité et faisant partie de notre collection ; un autre également ♂ capturé aux environs de Bordeaux, vallée de la Jacotte, en juillet 1927. Nous proposons le nom d'ab. *Divisa* nov. ab. pour les ♂♂ de *Pieris Rapæ* L. comportant le même caractère que pour la forme de *Brassicæ* L. décrite ci-dessus. Ça et là avec le type.

OBSERVATIONS. — Jusqu'à ce jour, seuls les ♀ ♀ de *Pieris Rapæ* L. portaient le nom de *Divisa* Gelin pour désigner l'aberration en question. (Deuxième macule du dessus des ailes supérieures séparée en deux).

29. *Colias Croceus* F. ab. *Bipupillata* nov. ab. — Se distingue en ce que la tache centrale jaune orange du dessus des ailes inférieures se divise en deux et présente ainsi deux taches parfaitement séparées l'une de l'autre. Avec le type, correspond à l'ab. *Bipupillata* Cabeau de *Colias Hyale* L.

REMARQUES. — Dans notre échantillon, l'ab. *Bipupillata* se présente seulement en dessus, le dessous restant comme dans la forme normale.

30. *Colias Erate* Esp. ab. *Semi-Faillæi* nov. ab. — Les nervures jaunes traversent entièrement la bande marginale noire des ailes inférieures. Un exemplaire ♂ dans notre collection provenant d'Uralsk, pris le 12-8-1907. Nous proposons le nom de *Faillæi* nov. ab. pour les sujets dont le caractère que nous venons de donner s'applique en même temps aux ailes antérieures et postérieures. Correspond à *Colias Croceus* F. ab. *Faillæ* Stef.

On distinguera également dans cette espèce l'ab. *Unimaculata* nov. ab. — Une seule tache orange au lieu de deux au milieu des ailes inférieures. Un exemplaire dans la collection Breignet, à la Société Linnéenne de Bordeaux, sans indication de provenance. — Ab. *Bipupillata* nov. ab. Mêmes remarques que pour C. *Hyale* L. et *Croceus* F. Nous exprimons ici le regret d'être dans l'obligation de donner un nom à toutes ces formes, mais d'autres espèces portant les mêmes caractères, ayant reçu une dénomination spéciale, nous ne pouvons faire autrement que de continuer à nommer celles qui nous tombent sous la main. Les Lépidoptéristes antivariétistes qui, sous prétexte d'encombrement de la nomenclature, ne veulent pas accepter ces nouveautés, doivent logiquement supprimer tout ce qui a été fait jusqu'ici se rapportant à ces formes.

31. *Lycæna Arion* L. ab. *Sub-Unicolor* nov. ab. — Dans cette nouveauté, les taches des ailes inférieures au recto ont complètement disparu. — Plusieurs spécimens dont deux ♀ ♀ capturées à Pompignac et au Bouscaut (Gironde). Dans ce département, *Sub-Unicolor* chez les ♂♂ paraît plus commun que le type. L'aberration ♀ est beaucoup plus rare. A classer près de la var. *Unicolor* Horm. dont toutes les taches du dessus des quatre ailes sont absentes sauf la tache discoïdale.

(A suivre.)

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

*Lagria Moutoni* n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, nigro-cyanescens; capite inæquale; antennis sat gracilibus, articulis 3 et sequentibus elongatis; thorace subquadrato, minute et diverse punctato; elytris thorace valde latioribus, sat elongatis, apice subacuminatis, marginatis, minute denseque punctatis aut plicatis; pedibus simplicibus. Long. 15-16 mill. Chine : Chang-Hai (coll. Pic). — Voisin de *sinensis* Fairm., dont il se distingue, à première vue, par sa coloration uniforme bleutée sans reflets métalliques.

*Lagria rufiventris* n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, pro parte subæneus, pectore medio abdomineque rufis; capite parum lato, ruguloso-punctato; antennis gracilibus; thorace parum breve, sat lato, ruguloso-punctato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, dense punctatis et pro parte plicatis. Long. 12-13 mill. Thibet (coll. Pic). — A placer près de *canescens* Fairm.

*Brachycoryna notaticeps* n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, capite postice flavo notato, pedibus, tarsis brunneis exceptis, flavo-testaceis, thorace elytrisque flavo-testaceis, illis postice minute brunneo maculatis, scutello antennisque brunneis, clava obscuriora, parum elongata; elytris minute costatis et fortiter lineato-punctatis. Long. 3 mill. R. Argentine (Wagner in coll. Pic.) — Voisin de *pumila* Guer., en diffère par la tête marquée de flave, la sculpture des élytres et la massue des antennes non globuleuse.

*Cephalolia latipennis* n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, antennis nigris; thorace breve et lato, antice fere recto, angulis anticis nullis, rotundatis, lateraliter fortiter et late marginato, parum et diverse punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, distincte marginatis, lineato-punctatis, pro parte substriatis. Long. 4 mill. Bolivie (coll. Pic). — Voisin de *nigriceps* Baly, mais forme plus élargie, tête rousse, etc.

*Cephalolia limbata* n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, castaneus, pedibus, thorace elytrisque lateraliter et apice late testaceis; capite antennisque rufescentibus; thorace breve et lato, antice medio valde emarginato, lateraliter antice subarcuato, lateraliter fortiter et medio minute punctato; elytris latis, sat brevibus, valde marginatis, humeris paulo prominulis, lineato-punctatis, pro parte striatis. Long. 4 mill. R. Argentine (coll. Bruch et Pic). — Voisin de *elegantula* Baly, en diffère par la forme plus élargie avec le prothorax plus transversal, la bordure claire plus étendue sur la partie postérieure des élytres.

(A suivre.)

M. Pic.

## Aux Abonnés

Bonne année, santé parfaite, récoltes entomologiques variées et fructueuses: voilà les souhaits abrégés, qu'à l'aube d'une année nouvelle, la rédaction de « L'Echange » est heureuse d'offrir à ses fidèles abonnés.

Pour 1928, l'envoi du journal sera continué à tous les anciens abonnés et ceux qui ne refuseront pas ce premier numéro seront considérés comme continuant leur abonnement pendant le cours de la présente année. On est prié d'envoyer, le plus tôt possible, le montant de l'abonnement, soit 7 francs pour les membres français et 12 francs pour les membres étrangers. Cela dit pour la bonne régularité des comptes et pour éviter les recouvrements par la poste, dont les frais sont actuellement très élevés. En tous cas, l'abonnement doit être versé intégralement, *sans aucun frais pour la Direction.*

Ont déjà payé leur abonnement pour l'année 1927, dans le courant de janvier, ou même avant, MM.: Bernard, Bertrand, D<sup>r</sup> Dallas, Dayrem, Dufaut, Heyrowsky, Lascols, Lecomte, Pionneau, Seyrig.

---

## Avis aux esprits critiques

Pour répondre une fois pour toutes à certains griefs (en partie imaginaires) formulés, ou en guise de protestation contre certains systèmes (plus ou moins exclusivistes) de publication, je crois devoir faire quelques observations impersonnellement exprimées. Ainsi, j'ai été accusé de refuser la communication de mes types. Les collègues qui me reprochent ce geste (le refus ne s'appliquant qu'aux uniques) devraient, en toute justice, convenir qu'à l'occasion je communique, et même à l'étranger, des types d'espèces décrites sur plusieurs exemplaires. J'aide volontiers les jeunes et nouveaux spécialistes dans l'étude d'une famille que j'ai travaillée avant eux, plusieurs ont profité, plus ou moins, de ma complaisance, sans que j'en aie été moi-même toujours payé en retour. Si je mentionne ici ma façon d'agir, c'est uniquement pour la présenter en opposition aux faits et gestes de ceux qui, aidés par moi, traitent ensuite avec la plus grande désinvolture ce que j'ai pu publier avant eux. J'admire la grande facilité de travail de certains entomologistes, qui leur permet de décrire de nombreuses nouveautés (bien qu'ils ne tiennent pas à en publier) sans s'être donné la peine de comprendre, au préalable (à l'aide des seules descriptions) toutes les formes antérieurement publiées. Rédiger une étude d'ensemble en ne s'occupant que des insectes que l'on a vus, cela peut être suffisant pour soi-même, mais non pour la collectivité, qui doit être *complètement* renseignée. Toute étude incomplète, si bien faite soit-elle, même établie sur des caractères nets et constants (ce qui n'est pas toujours le cas) porte en elle de sérieux germes de confusion future et, pour ma part, je me refuse à la recommander et aussi à la qualifier de *supérieure*. Je n'insiste pas sur ce dernier sujet particulièrement délicat à interpréter avec impartialité, ou générosité. Je me contente d'inviter particulièrement pour l'avenir (à titre de souhait sympathique et militaire) les auteurs qui se plaisent à passer sous silence les travaux (jugés un peu hâtivement incompréhensibles) de leurs prédécesseurs, de terminer leurs révisions futures (pour les rendre au moins complètes au point de vue documentaire) par un catalogue qui donnera quelques indications sur la longue suite des espèces, ou des variétés dont on ne parle pas.

M. Pic.

---

## Notes de chasses

M<sup>me</sup> et M. M. Pic ont capturé: 1° à Arleuf (Nièvre) et environs, fin juin et premiers jours de juillet: *Corymbites purpureus* Poda et *nigricornis* Panz.; *Denticollis linearis* L. et v. *mesomelas* L.; *Ctenioptus flavus* Scop.; *Pyrochroa serraticornis* Scop.; *Rhynchites cupreus* L.; *betula* L.; *nanus* Payk.; *Asemmum striatum* L. et var.; *Agapanthia villosoviridescens* Deg.; *Cryptocephalus 10-maculatus* L. et var.; *Melasona aenea* L. et var. diverses dont v. *purpureotincta* Pic.

2° A Bussy et environs d'Anost, en Morvan: *Dascillus cervinus* L. et var.; *Cantharis violacea* Payk.; *Rhagonycha translucida* Kryn.; *Strangalia ethiops* Poda, *noera* L., *4-fasciata* L.; *Plagionotus arcuatus* L.; *Superda scalaris* L. var.; *Liophus nebulosus* L.; *Agapanthia villosoviridescens* Deg.; *Oberea linearis* L.