

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (M. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodiens paléarctiques, Histiérides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Lathridiides.*

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridæ, Pittidæ, Nanophyes, Anthicidæ, Pedilidæ, Crticoceridæ, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e). *Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoïn

(12 Août 1928)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).
Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).
Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).
Quelques observations à propos d'Halticidés, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France: 7 francs. | Étranger: 12 francs.

MOULINS
LES IMPRIMERIES RÉUNIES
15, RUE D'ENGHEN, 15

ANNONCES

La page	32 fr.	Le 1/4 de page	10 fr.
La 1/2 page	18 fr.	Le 1/8 de page	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 12 mai 1928, 51 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Paiement à l'avance. Frais de port en plus.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages)	20 fr.
Edition réduite	10 fr.
Annonces seules	5 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN
(Haute-Garonne).

Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Cardiophorus sacratus v. nov. sinuatevittatus. Nigro-metallicus, pedibus pro parte thoraceque rubris, illo medio nigro sinuate-vittato. Cyrenaïque. Cirène (type, in Mus. Civico di Genova). — Variété caractérisée par la forme particulière de la bande thoracique qui est sinuée mais rétrécie postérieurement, ainsi que par les pattes en partie rougeâtres, cette coloration étendue sur les cuisses et la base des tibias antérieurs et intermédiaires.

Attalus sicarius v. nov. obscuripes. Pedibus nigris, tibiis anticis infra pro parte vage tarsisque rufescentibus, thorace nigro, lateraliter rufo. Sicile (coll. Pic). — Diffère de la forme type par la-coloration générale foncée des pattes.

Notoxus latus n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, pro parte hirsutus, rufotestaceus, elytris pallidioribus, in singulo ad scutellum vage et breve brunneo maculatis, post medium et in disco late piceo maculatis. Long. 4,5 mill. Samarkand (Reçu de A. Suvorow).

Cette espèce, de forme relativement élargie aux élytres, est nettement distincte de *histrix* Pic, par ses élytres bimaculées et ses antennes fortes, un peu élargies à l'extrémité, à dernier article long ; le prothorax est globuleux, muni d'une corne longue et assez étroite (vue du dessus), abaissée et échancrée vers l'extrémité (vue de profil), les élytres sont relativement courtes et larges, subtronquées à l'apex.

Cartellum thoracicum v. nov. diversipes. Pedibus rufis, femoribus apice late nigris. Alep (coll. Pic).

Aromia moschata v. nov. notaticollis. Cyaneus, membris violaceis, thorace in disco externe rubro notato. Sicile (coll. Pic). — Voisine de la *v. ambrosiaca* Stev., mais avec les tubercules latéraux du prothorax bleus.

Colaphomega signatipennis v. nov. reducta. Elytris testaceis, antice reducte nigro trimaculatis, sutura nigra. Algérie : Philippeville (coll. Pic). — Diffère de la forme type, par des dessins noirs réduits et l'absence de rebord latéral varié noir.

Colaphomega ruffrons v. nov. latenigra. Macule discale noire des élytres très élargie, et s'étendant en partie jusque sur la suture et vers l'extrémité qui se rembrunit. Algérie (coll. Pic).

Je possède, sous le nom de *Colaspidea syriaca* Dej., originaire de Syrie, un curieux *Phytophage* offrant un peu le faciès de *Xenomela* Weise, de forme plus allongée que les *Colaphellus* Weise, ayant certains caractères que je juge propres à la création d'un genre nouveau dont voici le signalement descriptif :

Falsocolaphellus n. genre. Corpus oblongus ; capite parum elongato, inter oculos non transverse sulcato sed breve longitudinaliter sulcato ; antennis gracilibus ; thorace postice marginato ; elytris ad basim externe marginatis, epipleuris postice regulariter attenuatis ; pedibus parum robustis, tibiis apice paulo dilatatis. — Genre caractérisé surtout par la forme de la tête et le rebord basal des élytres, pouvant prendre place près de *Colaphellus* Weise.

Falsocolaphellus syriacus n. sp. Oblongus, antice et postice paulo attenuatus, convexus, nitidus, parum pubescens, nigro-æneus, labro membrisque testaceis ; capite inæquale, antice fortiter punctato ; thorace parum breve, lateraliter arcuato, sparse sat fortiter punctato ; elytris thorace non latioribus, postice attenuatis, humeris nullis, diverse sat sparse punctatis, externe substriatis. Long. 5 mill. Syrie (coll. Pic).

(A suivre.)

M. PIC.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Emplectus Hickeri n. sp. ♂. Angustatus, fere parallelus, subnitidus, breve pubescens, niger, thorace luteo-aurantiaco, postice medio nigro notato, elytris luteo-aurantiacis, apice breve nigro notatis et in disco reducte nigro lineatis, trochanteribus femoribusque ad basim testaceis ; antennis parum gracilibus, longe et sinuate flabellatis ; thorace elongato, lateraliter postice fere recto, angulis posticis postice paulo prolongatis, in medio postice longe areolato et antice carinato ; elytris thorace non latioribus, elongatis, diverse pro parte fortiter costatis, costis intermediis postice oblitteratis, intervallis antice bi et postice quadri punctato-fenestratis. Long. 8-9 mill. Brésil (coll. Hicker et Pic). — Voisin de *breveapicalis* Pic, en diffère par la forme moins allongée, les élytres sans linéole suturale noire antérieure, autrement marqués de foncé à l'apex, les pattes non entièrement noires.

Laokaya (Boppe) n. gen. [Prionini]. Robustus, deplanatus ; mandibulis brevibus, non arcuatis ; antennis brevibus, gracilibus, articulo 1^o elongato ; thorace lateraliter inæquale et multi dentato ; elytris latis et brevibus, posthumeros, late deplanatis ; pedibus inspinosis, tibiis incarinatis ; prosterno horizontale, postice longe producto. — Peut se placer près de *Logaeus* Wat., en diffère nettement par le prothorax de structure tout autre, à dents inégales et les antennes courtes.

Laokaya Vitalisi n. sp. ♀. Robustus, deplanatus, nitidus, nigro-piceus, pro parte castaneus ; capite medio sulcato, postice minute et dense granuloso ; thorace breve et lato, medio fere laeve, lateraliter diverse punctato et pro parte plicato ; scutello semicirculaire, sparse punctato ; elytris latis, sat brevibus, minute pro parte dense ruguloso-punctatis, ad basim diverse sparse et fortiter punctatis ; pygidio prominulo. Long. 50 mill. Haut-Tonkin : Laokay (coll. Pic).

Prionocornis n. gen. [Prionini]. Mandibulis brevibus, antennis gracilibus, corpore longe superantibus ; thorace medio longe dentato ; elytris latis et brevibus, thorace latioribus ; pedibus gracilibus, inspinosis, tibiis carinatis, villosis ; prosterno postice

Calochromus subflabellatus n. sp. Angustatus, niger, pro parte cyanescens, thorace elytrisque purpureis, his apice sat breve nigro-violaceis; antennis validis, nigris, articulo 2^o minutissimo, 3^o subtriangulare, 4^o et sequentibus elongatis, infra subpectinatis; thorace breve, antice attenuato, medio longe et late impresso, postice late biimpresso, angulis posticis fere rectis; elytris elongatis, pro parte costulatis. Long. 10 mill. Java, ex Dreischer, communiqué par Kleine. — Espèce voisine de *purpureicollis* Pic, très distincte par sa structure antennaire.

Stadenus inapicalis n. sp. Sat elongatus, nitidus, nigro-piceus, thorace pro parte vage rufescente, elytris aurantiacis, articulis 2 ultimis antennarum testaceis; antennis sat crassis, articulo, 3 lato, sat breve, 4 et sequentibus elongatis, depressis, ultimis attenuatis; thorace parum breve, sat lato, antice subarcuato, angulis posticis paulo prominulis; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, subparallelis, apice paulo attenuatis, 4 costatis, intervallis bilineato punctato-fenestratis. Long. 7 mill. Uganda, ex Neave, communiqué par Kleine. — Par sa coloration élytrale concolore, à placer près de *xanthopterus* Brg., ce dernier est plus allongé et a les antennes entièrement foncées.

S. innotatus n. sp. Elongatus, niger, thorace circa elytrisque rufo-aurantiacis, articulo ultimo antennarum testaceo. Long. 10-12 mill. Uganda, ex Sowdey, communiqué par Kleine. — Diffère du précédent, en plus de la coloration du prothorax, par la forme plus allongée et l'avant-dernier article des antennes noir.

Lygisteropterus inapicalis n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace lateraliter elytrisque rubro-aurantiacis, his ad scutellum breve nigro-notatis; antennis sat validis, depressis, apice attenuatis; thorace subquadrato, antice paulo attenuato, medio sulcato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, multi costatis. Long. 13 mill. Uganda, ex Neave, communiqué par Kleine. — Très voisin de *breve-lineatus* Pic, s'en distingue, à première vue, par les élytres sans macule apicale foncée, le prothorax non transversal, plus largement noir au milieu.

Xylobanus Ancyi n. sp. Angustatus, nigro-fuliginosus, articulis tribus ultimis antennarum, thorace, scutello, elytris, his apice breve nigro-notatis, femoribusque ad basim aurantiacis; antennis deplanatis, infra paulo dentatis; thorace sat elongato, lateraliter subparallèle, medio postice areolato; elytris elongatis, transverse fenestratis. Long. 10 mill. Ashanti (1). Peut se placer près de *Xanthomerus* Brg.

X. atrimembris n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace, illo postice paulo brunnescente, scutello elytrisque flavo-aurantiacis, his apice late nigro notatis; antennis, depressis, infra paulo dentatis; thorace parum lato, antice medio subtriangulare, obconico, lateraliter postice paulo latiore, angulis posticis inæquale prominulis, medio postice areolato et antice carinato; elytris elongatis, subquadrato-fenestratis. Long. 7 mill. Afrique: Nyasa, ex Neave, communiqué par Hicker. — Par la structure de son prothorax qui ne présente qu'une aréole distincte se rapproche de *fuscatus* Brg., il en diffère par les membres concolores foncés, la tête foncée et le dessus brillant.

Carphurus homalioides Pic (1917) préoccupé par *homalioides* Brg. (1891) devra prendre le nom de **mutatus**.

(1) Les espèces et variétés sans indications spéciales sont de ma collection.

Carphuroides paulonotatus n. sp. Elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris piceis, postice vage albo notatis, his fortiter sat sparse punctatis; infra corpore circa apice excepto, albo marginato; antennis nigris, ad basim testaceis, robustis, articulis 4 et sequentibus diverse pectinatis; capite antice triangulariter impresso, posticè fere læve; thorace subquadrato, læve; elytris thorace paulo latioribus, parallelis. Long. 3 mill. Sumatra. — Voisin de *discoidalis* Pic, mais forme élytrale plus parallèle, tête autrement ponctuée, etc.

C. punctaticeps n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, elytris brunnescentibus, minute punctatis; antennis validis, nigris, ad basim testaceis, articulis 5 et sequentibus pectinatis; capite fortiter et dense punctato, antice biimpresso; thorace subquadrato, læve. Long. 3 mill. Sumatra. — Espèce caractérisée par la ponctuation forte et rapprochée de la tête.

C. tibialis n. sp. Elongatus, nitidus, distincte pubescens, niger, antennis ad basim tibiisque anticis testaceis, his paulo dilatatis, articulo 1^o tarsarum longissimo, arcuato; capite parum punctato, antice biimpresso; thorace parum elongato, læve; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, postice paulo dilatatis, diverse pro parte fortiter et sparse punctatis. Long. 3 mill. Java. — Très distinct du précédent par la tête presque lisse et la structure des pattes antérieures.

C. nitidissimus. n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, distincte pubescens, niger, elytris vage cyaneis, antennis ad basim testaceis; capite sparse punctato, antice biimpresso, antennis validis, sat brevibus; thorace breve, sat lato, antice paulo attenuato, læve, postice paulo impresso, marginato; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, postice dilatatis, minute sat sparse punctatis; tibiis anticis gracilibus, articulo 1^o tarsarum minuto. Long. 2,5 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, pattes antérieures différentes, ponctuation élytrale moins distincte, etc.

Chauliognathus rufipes Pic. Varie par les élytres, soit ornées chacune, vers le milieu, de deux macules foncées (v. nov. *4-notatus*), soit d'une grande macule antéapicale rembrunie (v. nov. *Haasi*). Paragwey.

Ch. fallax v. nov. *medioreductus*. Elytris ad basim nigro notatis et ad medium minute nigro maculatis. Brésil.

Ch. unifasciatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, infra corpore pro parte testaceo; thorace subquadrato, rubro, antice nigro marginato; elytris elongatis, opacis, nigris et ad medium testaceo fasciatis (*forma typica*) aut concoloribus, nigris (v. nov. *Donceeli*); aliquot elytris nigris, thorace scutelloque rubris (v. nov. *jatayensis*). Long. 13-16 mill. Brésil. — Peut se placer près de *Haversii* Wat.

Ch. atrimembris n. sp. Parum elongatus, subopacus, nigro-fuliginosus, capite antice et infra corpore pro parte luteis; thorace aurantiaco, postice medio nigro maculato. Long. 14 mill. Brésil. — Plus robuste que le précédent, élytres moins parallèles. A placer près de *diosensis* Pic.

Ch. luteobasalis n. sp. Parum elongatus, subopacus, niger, capite ad oculos et infra corpore pro parte testaceis; thorace aurantiaco, medio postice nigro maculato, macula postice bilobata; elytris postice attenuatis, nigris, ad basim luteo-aurantiaco sinuate fasciatis. Long. 12 mill. Brésil. — Voisin du précédent, ainsi que de *ju-cundus* Gorb.

Ch. jucundus v. nov. *breveapicalis*. Elytris nigris, ad basim aurantiaco fasciatis et apice breve luteo notatis. Brésil.

Ch. luteobinotatus n. sp. Elongatus, subnitidus, niger, capite ad oculos, thorace infra, corpore pro majore parte femoribusque ad basim luteis, elytris nigris, antice ad suturam longe et apice breve sulphureo notatis. Long. 8 mill. Paragüey. — A placer près de *luteofasciatus* Pic.

Ch. corumbanus n. sp. Elongatus, nitidus, flavo-testaceus, capite pro majore parte membrisque, femoribus ad basim rufis exceptis, nigris; capite elongato; thorace angustato, antice attenuato; elytris elongatis, postice attenuatis. Long. 11 mill. Brésil. — Voisin de *longiceps* Pic, tête moins longue et coloration différente.

Ch. pelotatus n. sp. Parum elongatus, postice valde attenuatus, subopacus, niger, abdomine luteo-testaceo elytrisque medio late, antice oblique luteo fasciatis; thorace rubro, antice nigro marginato et ad medium transverse et reducte nigro notato. Long. 13 mill. Brésil. — Par sa forme voisin de *Schuppeli* Bourg., prothorax plus transversal, coloration élytrale différente.

Ch. longissimus n. sp. Angustatus, subopacus, nigro-fuliginosus, elytris pro parte brunnescentibus, testaceo marginatis, infra corpore pro parte testaceo. Long. 22 mill. Equateur. — Espèce très distincte par sa forme étroite et allongée.

Ch. cyaneipennis n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace rubro notato; elytris cyaneo-metallicis, subparallelis ♂, aut postice paulo dilatatis ♀. Long. 11-13 mill. Pérou. — Voisin de *trimpresicollis* Pic, mais plus brillant avec le prothorax bicolore et les pattes foncées.

Ch. riosus n. sp. Oblongus, parallelus, nitidus, niger, capite ad oculos, thorace circa, abdomine pro parte elytrisque testaceis, his ad basim arcuate nigro fasciatis, granulosis, ad suturam paulo angulatis, pedibus pro parte rufis. Long. 10 mill. Brésil. — A placer près de *grandipes* Pic, en diffère par les élytres plus parallèles, marquées de noir autour de l'écusson jusqu'aux épaules.

Plectonotum grandicolle n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace flavo, pro parte piceo marginato in disco postice brunneo vittato, illo sat transverso, lateraliter subarenato. Long. 8 mill. Chili. — A placer près de *Reedi* Pic.

Discodon roonense Pic (1923) préoccupé par *roonense* Pic (1919) devra prendre le nom de *Jacqueti*.

D. minutum n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite antice thoraceque lateraliter late flavo-testaceis, elytris piceo fuliginosis, pedibus pro parte brunneis; antennis sat robustis. Long. 6 mill. — Espèce caractérisée par sa petite taille et sa coloration en majeure partie foncée. — Parfois les élytres sont antérieurement étroitement bordées de gris sur les côtés de la suture: v. nov. *paulolimbatum*, de la R. Argentine.

D. reflexicollis n. sp. Minutus, sat latus, subopacus, niger, abdomine flavo-notato, thorace circa flavo, in disco rufescente et postice medio piceo notato, particulare, late fortiter marginato, medio late impresso et subplicato; antennis robustis. Long. 5 mill. Bogota. — Voisin du précédent, remarquable par la structure et la coloration du prothorax.

D. criollanum n. sp. Parum elongatus et robustus, subnitidus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad scutellum minute et apice late nigro notatis; antennis parum gracilibus; thorace robusto, lateraliter ad medium paulo inciso; elytris sat brevibus, minute et reducte costulatis. Long. 7-8 mill. R. Argentine. — Espèce distincte entre toutes par sa forme robuste jointe à sa coloration. — On peut attribuer à cette espèce, comme variétés, les dessins élytraux suivants: v. **medio-junctum**, ayant, en plus de la macule apicale noire, une bande suturale antérieure élargie en avant, — v. **suturiferum**, élytres munies d'une bande suturale noire dilatée postérieurement sans atteindre les côtés.

D. externenotatum n. sp. Robustus, nitidus, niger, capite antice, thorace, illo medio nigro notato, coxis elytrisque aurantiacis, his apice late nigro maculatis, ad scutellum longe nigro notatis et ad medium externe minute nigro notatis, fere incostatis. Long. 9 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

Falsopolemius brevehumeralis n. sp. Elongatus, parum nitidus, capite antice, thorace lateraliter elytrisque ad humeros breve aurantiacis; thorace breve et lato; elytris elongatis, pro parte ruguloso-punctatis; pedibus brunnescentibus. Long. 8 mill. Brésil. — Caractérisé, à première vue, par sa coloration.

Le **F. inapicalis** mihi, du Pérou, ressemble beaucoup à *otuzcosus* Pic, mais il a les élytres entièrement testacées, le prothorax tout noir, à angles postérieurs moins prolongés.

F. prelineatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad apicem nigro maculatis, ad suturam antice et ad medium externe et reducte nigro lineatis (*forma typica*), signaturis nigris aliquot junctis (v. nov. **latesignatus**), aut linea mediana oblitterata (v. nov. **oblitteratus**). Long. 6-8 mill. R. Argentine. — Diffère, à première vue, du précédent par les élytres moins mates et nettement pubescentes.

F. latenotatus n. sp. Elongatus, subnitidus, niger, capite antice flavo, thorace circa, elytris ad humeros et post medium testaceis, femoribus ad basim breve rufis; thorace elongato, lateraliter sinuato, medio subdentato. Long. 7 mill. Bolivie. — Diffère du précédent par la tête flave en avant, le prothorax plus long, à bande noire médiane réduite, etc.

F. suboblitteratus n. sp. Angustatus, subopacus, niger, capite antice, coxis, thorace, illo medio nigro lineato elytrisque aurantiacis, his ad medium nigro fasciatis et antice ad suturam nigro lineatis; antennis parum crassis; thorace sat breve et lato, antice attenuato et subarcuato; elytris longissimis, opacis, costatis. Long. 8 mill. Colombie. — Se distingue, à première vue, du précédent par les élytres plus longues, non marquées de noir au sommet.

Dasytes cyaneomaculatus n. sp. Angustatus, nitidus, sparse pubescens et hirsutus, viridi metallicus, capite antice, thorace, illo medio cyaneo maculato, pedibusque testaceis, tarsiis antennisque nigris, articulis primis infra rufis; thorace breve, parum lato, fortiter et sparse punctato; elytris parallelis, ruguloso-punctatis. Long. 4 mill. Chili. — Voisin de *Gayi* Sol. s'en distingue, à première vue, par le prothorax maculé, la sculpture élytrale différente.

declive. — Ressemble à *Sarmyds* Pac. par la structure thoracique, mais plus robuste et d'ailleurs très distinct, de ce genre, comme des autres, par ses antennes graciles et très longues.

Prionocornis latipennis n. sp. Niger, opacus, capite thoraceque fortiter, diverse pro parte sparse punctatis; elytris latis et brevibus, sat regulariter et parum fortiter punctatis, in disco costulatis. Long. 23 mill. Tonkin : Chapa (coll. Pic).

Microcapnolymma n. gen. Angustatus; antennis gracilibus, elongatis; capite antice lato, collo longe munito; thorace longissimo, post medium paulo dilatato, lateraliter multisinuato; elytris thorace paulo latoribus, parum elongatis; pygidio prominulo; femoribus subclavatis. — Genre particulier et très caractérisé, voisin de *Capnolymma* Pasc., avec la tête carrée en avant, le prothorax plus long, plus étroit, les élytres moins robustes, etc.

Microcapnolymma angustata n. sp. Angustatus, et elongatus, nitidus, niger, supra vage violaceus, femoribus rubris, elytris ad medium reducte argenteo fasciatis; capite inter oculos bifoveolato, medio sulcato; thorace supra fere impunctato, infra medio fortiter punctato; elytris mediocre, ad medium densiore, punctatis. Long. 13 mill. Cochinchine (coll. Pic).

Clytomelegena n. gen. Angustatus, capite breve, antennis gracilibus, elongatis articulo 1^o curvato; thorace elongato, parum robusto, ad medium lateraliter tuberculato; elytris thorace non latoribus, elongatis, apice subacuminatis; pedibus sat gracilibus, femoribus non clavatis, longe et sparse pilosis. — Genre très curieux ayant un faux air de *Clytide* avec de longues antennes et pouvant se placer près de *Melegena* Pascæ, in *Disteniini*.

Clytomelegena postaurata n. sp. Angustatus, opacus, niger, griseo pubescens, elytris postice aurato pubescentibus, ad medium glabro nigro-fasciatis, his antice fortiter lineato punctatis; thorace pro majore parte minutissime denseque punctato, antice et postice transverse plicato. Long. 10 mill. Annam : Dalat. (coll. Pic).

Distenia sparsepunctata n. sp. Angustatus, niger, olivaceo pubescens; thorace parum breve, lateraliter valde sinuato et medio dentato; elytris postice attenuatis, antice regulariter lineato-punctatis. Long. 25 mill. Annam (coll. Pic). — Diffère de *japonica* Bates, par la ponctuation élytrale plus régulière, la coloration plus foncée.

Pseudamarigmus semiconvexus n. sp. Oblongus, nitidus, pro parte griseo pubescens, rufus, capite postice, thorace supra elytrisque æneis, thorace pro parte viridescente, antennis apice piceis; thorace breve, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris medio valde convexis, apice attenuatis et subacuminatis, minute striato-punctatis, intervallis parum sparse punctatis, epipleuris rufis. Long. 4,5 mill. Mentawai. — Voisin de *Dohertyi* Pic, forme différente, ponctuation élytrale moins écartée.

(A suivre.)

M. Pic.

Quelques observations à propos d'Halticides

Déjà, par exemple en 1926 (*Misc. Ent.* 34, p. 93, 94, à propos du genre *Derocrepis* Weise), j'ai dû réfuter certaines synonymies, particulièrement celles d'un auteur autrichien qui les prodigue largement en ma faveur lorsqu'il s'agit d'Halticides.

Presque aucune de mes créations ne peut résister à la puissance destructive du coup d'œil démolisseur de ce spécialiste, et j'en suis quelque peu surpris, alors que je vois, par ailleurs, mes *Aphthona Vaulogeri* et *Henoni*, *Dibolia Vaulogeri* et *Mantura Henoni*, qui semblent acceptées comme valables par un de nos entomologistes les plus en vue. Je ne mets pas volontairement les points sur les *i* : on peut me comprendre entre les lignes et cela suffit. Je vais parler ici, particulièrement, du genre *Psylliodes* Bert. et protester contre une nouvelle série synonymique ; vraiment, l'auteur dont je parle semble préoccupé avant tout de ne pas admettre les formes que j'ai pu décrire, soit comme espèce, soit comme variété.

Si ce spécialiste voit très *petit* quand il s'agit de juger de l'intérêt des productions étrangères, par contre il voit *grand* lorsqu'il s'agit d'établir des formes nouvelles. Ainsi, je relève à son actif, entre autres nouveautés, les *P. v. angulicollis*, v. *testaceoconcolor* (de *cuprea* Kntch.), ab. *testaceoconcolor* (de *circumdata* Redt.), fa. *brunneotestacea*, subsp. *Normandi*. etc. En opposition, ou compensation, mes *P. Leprieuri*, *Augustalisi*, *pallidicolor* et *libanicola*, sont mis en synonymie pure et simple dans une étude d'ensemble morcelée à plaisir (traitée en plusieurs parties, de 1921 à 1926, et qui, à cette dernière date, ne semble pas encore terminée). Pour ne pas perdre mon temps outre mesure, je me contenterai, avec quelques réflexions d'ordre général, de réfuter deux synonymies seulement : *P. Augustalisi* Pic, mis en synonymie de *cucullata* Ill. et *libanicola* Pic, mis en synonymie de *picina* Marl., tous deux originaires du Liban.

Je trouve très original l'esprit d'un auteur qui le pousse, en 1921, à n'admettre, pour un groupe de *Psylliodes* Bert., à peu près rien que des espèces ou sous-espèces, alors que, en 1926, pour un autre groupe du même genre (le jugement de ce descripteur aurait-il évolué dans le sens variétiste ?) (1), il a su reconnaître, ou décrire, des variétés, ou aberrations, assez nombreuses. Mais, s'il n'a pas parlé de *P. v. impuncticollis* Chob., ce ne doit pas être un oubli, cet auteur est au-dessus de ce genre d'erreur, comme d'ailleurs de toutes coquilles dans ses écrits, quand ils ne sont pas vus à la loupe.

Le grand spécialiste synonymiqueur a vu le type de *P. Augustalisi* en 1910, et me l'a retourné alors sans indication spéciale ; cela devrait laisser entendre qu'à cette époque il acceptait mon espèce comme valable ; pourquoi en a-t-il jugé autrement en 1926 ? Serait-ce qu'antérieurement cet auteur n'avait pas étudié assez sérieusement les Halticides, ou n'est-ce pas plutôt qu'après 1914, ce spécialiste a travaillé avec une nouvelle mentalité (que j'ai d'ailleurs constatée avec regret chez d'autres entomologistes étrangers), qui ne répond pas absolument à un esprit de justice et d'impartialité.

(A suivre.)

M. PIC.

(1) Dans ce cas on n'aurait qu'à l'en féliciter, tout en s'étonnant de sa parcimonie pour l'admission des variétés des autres.

Avis et Renseignements divers

Les abonnés de l'« Echange » non encore en règle, malgré les avis répétés, pour le paiement de leur abonnement, ne seront pas étonnés de ne plus recevoir le journal à partir d'aujourd'hui. Pour ces retardataires, il leur sera inutile de réclamer des numéros manquants avant de s'être préalablement acquittés du montant de l'abonnement pour l'année courante, soit 7 fr. pour la France et 12 fr. pour l'Étranger.

Depuis qu'a paru le N° 432, nous avons reçu les abonnements de MM. Fagniez, Granger, Hustache, Jacquet, Marcot, Dr Normand, Pillault, de Peyerimhoff, Puel, Roger, Roubal, Sirguy, Dr Sicard, Théry, Testout, Librarian Zool. Soc.

Le directeur de l'« Echange » demande encore un peu de répit à ses correspondants avant l'envoi de nouveaux insectes d'étude, pour qu'il puisse en terminer avec les anciennes communications restant encore en souffrance; par suite du **surnombre** des envois reçus, il est matériellement impossible au déterminateur de travailler plus rapidement.

Il est rappelé aussi que tous les frais doivent être supportés par les expéditeurs et non par le déterminateur.

BULLETIN DES ÉCHANGES

M. L. Puel, Albaron (Bouches-du-Rhône) échange (contre Coléoptères) et achète tout **Dyschirius** en tout nombre d'exemplaires, à l'exception du *D. globosus*, de l'Europe.

M. J. Dayrem, à Laghouat (Algérie) échangera de nombreux coléoptères rares du désert, surtout nocturnes et *Cerambycides* de Kabylie. Demande *Longicornes* du globe nommés et irréprochables. Se réserve contre envois pour les correspondants nouveaux. Listes cotées à partir fin août.

BIBLIOGRAPHIE

Après beaucoup de retard, ou d'infortunes diverses, le 2^e volume du « Catalogue Analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire et des départements limitrophes » a pu être enfin composé. On pourra se le procurer (l'auteur, M. Pic, ne peut disposer que de deux exemplaires complets et de quelques-unes des dernières feuilles) en s'adressant à l'Imprimerie L. Taverne et Ch. Chandioix, à Autun (Saône-et-Loire). Ce deuxième volume comprend les *Cryptomères*, *Pectinicornes*, *Lamellicornes*, *Cavicoxes* et se termine avec les *Longipennes* (ou Malacodermes divers).

Malheureusement, de nombreuses coquilles, dont certaines dénaturant complètement des noms d'insectes (corrigées dans un article spécial qui n'a pas eu sa place dans le volume) restent dans ce travail; pour celles-ci, il y a lieu de solliciter toute l'indulgence possible et cela surtout auprès des esprits enclins à la critique facile.

D'autre part, le 3^e volume du *Catalogue* (avec les Hétéromères) a commencé de paraître dans le « Bulletin de la Soc. d'Histoire Naturelle d'Autun » et sera continué par fragments.

Le volume des insectes de la *Mission Rohan-Chabot (Angola et Rhodesia)* a été distribué dernièrement aux auteurs.

NOTES DE CHASSES

M. et Mme Maurice Pic ont capturé, en juillet 1928, 1° Dans les Bois-Noirs (arrêt d'une demi-heure lors d'une excursion en auto) près de Saint-Priest-la-Prugne (Allier): *Malthinus minimus* Ths., *Helodes minutus* L., *Athous vittatus* F., *Strophosomus coryli* F., *Saperda populnea* L., *Adoxus obscurus* L., *Phyllopecta laticollis* Suf., *Cryptocephalus nitidulus* F. et *labiatus* L.; 2° à Costaros (Haute-Loire): *Carabus* var. *purpureus* F. et *catenulatus* Scop., *Tachinus rufipes* Deg., *Dermestes mustelinus* Er., *Anthaxia 4-punctata* L., *Prosternon tessellatum* L., *Trichoclebe? fulvohirtus* Bris., *Haplocnemus nigricornis* F., *Magdalis phlegmatica* Herbst. var. et *duplicata* Germ., *Metallites atomarius* Ol., *Brachytes lusitanicus* F., *Sitona flavescens* Marsh., *Anthonomus varians* Payk. et *Lophyrus pini* L., la plupart des insectes récoltés en battant des pins, à la nappe montée.