

# L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (G. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodiens paléarctiques, Histiérides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Lathridiides.*

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melypide, Ptilinide, Nanophyes, Anthécide, Pédilide, Crioceride, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>)  
*Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoin

(2 Mai 1929)

## SOMMAIRE

Notes diverses, nouveautés, par M. Pic (suite).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

Nouvelles espèces, sous-espèces et morphes paléarctiques du genre  
*Mylabris* F., par G. SOUMACOV (hors-texte) (fin).

Sur *Chauliognatus subapicalis* Pic, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 7 francs. | Étranger : 12 francs.

MOULINS.

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN 15

# ANNONCES

La page . . . . .	32 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	10 fr.
La 1/2 page . . . . .	18 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	6 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

---

*En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.) les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

---

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 2 mai 1929, 53 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Paiement à l'avance. Frais de port en plus.

---

## "Miscellanea Entomologica"

*Revue entomologique internationale*

---

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages) . . . . .	20 fr.
Edition réduite . . . . .	10 fr.
Annonces seules . . . . .	5 fr.

---

Direction et Rédaction: E. BARTHE  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

### Pour les déterminations

*Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.*

*Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire!*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, nouveautés

PAR M. PIC

Roubal a décrit (*Eos* IV, 1928, p. 96) comme nouveau le sexe ♂ de *Ctenistomorphus elaniticus* Raffray, alors que, précédemment, de Peyerimhoff (*Bul. Soc. Ent.*, Egypte 1925, p. 60) a déjà publié le signalement descriptif de ce sexe et donné des figures de l'avant-corps des deux sexes de cette espèce, comparés aux ♂ ♀ du *Tecnesis* (*Ctenistes* Olim.) *Vaulogeri* Pic.

Dans la nouvelle édition des *Elaterides* de feu du Buysson (*in Misc. Entom.* XXXVI, 1929), au bas de la page 256, l'auteur a rédigé, à propos de *Campylus linearis* L., un curieux paragraphe que voici : « Pour les collectionneurs de variétés, nous pouvons indiquer encore la note de M. Pic (*Revue Linnéenne*, n° 378, p. 21, 1919) ». C'est, je l'espère, le dernier exemple que j'aurai à relever sur la façon partielle et très dédaigneuse de cet auteur en faveur de la plupart de mes dénominations variétistes.

La référence bibliographique du *critique* est entachée d'une date *défectueuse*, le n° 378 de *L'Échange* a paru en 1916, et non pas en 1919.

*Phyllocerus apicalis* n. sp. ♂. Elongatus, postice attenuatus, subnitidus, griseo pubescens, niger elytris testaceis, apice brevis nigro notatis, articulis 5 et sequentibus antennarum diverse flabellatis et rufis. Capite thoraceque parum fortiter et densissime anguloso-punctatis, illo sat brevis, lateraliter subarcuato, angulis anticis rectis et ciliatis, posticis postice sat prolongatis; articulo 2° antennarum sat brevis, 3° elongato, 4° triangulare, 5° et sequentibus diverse aut arcuate flabellatis, ultimo simplice, sat elongato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice valde attenuatis, distincte striatis, intervallis subconvexis, minute et dense punctatis. Long. 13 mill. Cyrénaïque. Communicé par M. Gridelli, du Musée de Gênes. — Intermédiaire entre *P. flavipennis* Guer. et *P. elateroides* Mén., plus voisin du second par le 4° article des antennes noir, muni d'un rameau flabellé, très distinct par les élytres moins longues, marquées de foncé au sommet, la forme plus étroite, la ponctuation plus dense du prothorax.

Les organes génitaux dans ce genre sont formés de trois parties saillantes en dehors, une médiane plus longue, les latérales épineuses au sommet, les trois lobes sont plus courts chez *P. apicalis* mihi que chez les deux autres espèces ci-dessus nommées, le médian est plus spiniforme et fortement arqué, les latéraux sont plus larges postérieurement.

*Ptinus dilataticornis* n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, luteo hirsutus, elytris externe vage albo bimaculatis; antennis crassis, dense luteo pubescentibus; thorace brevis, medio transverse quadridentato piloso, ad basim depresso; elytris latis, sat brevibus, fortiter striato-punctatis, apice attenuatis et explanatis; pedibus dense luteo pubescentibus, femoribus anticis valde curvatis. Long. 3 mill. Egypte M<sup>le</sup> (coll. Pic). — Voisin de *latipennis* Pic, antennes plus larges vers la base, avec les cuisses antérieures très arquées, les élytres plus explanées à l'apex.

**Anthicus biargenteofasciatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, paulo griseo pubescens, niger, geniculis, tibiis pro parte et tarsisque paulo rufis, elytris argenteo bifasciatis. Capite sat breve et lato, postice arcuato, parum punctato; antennis sat brevibus, apice paulo dilatatis, articulo ultimo longiore, acuminato; thorace breve et lato, antice rotundato, lateraliter postice argenteo pubescente, parum punctato; elytris thorace latioribus, parum elongatis, lateraliter subarcuatis, apice subtruncatis, antice oblique impressis, minute, pro parte dense, punctatis; pygidio paulo prominulo. Long. 4 mill. Maroc: Grand Atlas (R. Maire, in coll. Peyerimhoff). — Très voisin de *A. superbus*. v. *Pueli* Chob., plus robuste avec le prothorax plus large, les élytres ayant leur fascie postérieure argentée disposée sur un fond général noir.

**Brachyesthes indentatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger; capite sparse granuloso; thorace breve et lato, lateraliter arcuato, antice attenuato, minute et sparse granuloso; antérieurement ciliato; elytris latis, sat brevibus, apice attenuatis, sat sparse punctatis; tibiis anticis non dentatis, apice dilatato-rotundatis, ad medium subangulatis. Long. 8 mill. Tunisie: Gafsa (Pic). — Voisin de *brevior* Fairm., en diffère, à première vue, par la particulière structure des tibias antérieurs et les granules espacées du prothorax.

**Asclera sulcicollis** n. sp. Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, nigro-olivaceus, capite thoraceque paulo æneis; capite inter oculos impresso; thorace parum elongato, medio sulcato; elytris elongatis, apice attenuatis, costula lateralis parum distincta et postice oblitérante. Long. 7 mill. Mandchourie (coll. Pic). — Espèce très distincte par son prothorax sillonné conjointement à sa coloration générale foncée.

**Zubkovia persica** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, elytris brunneis, testaceo cinctis; articulo 3<sup>e</sup> antennarum 2<sup>e</sup> multo longiore, ultimo irrégulier; articulo ultimo palparum elongato, apice truncato; mandibulis unidentatis; thorace parum breve, antice dilatato, externe biimpresso, antice transverse plicato, postice arcuato sulcato, minute et sparse punctato; elytris thorace valde latioribus, subparallèles, apice breve attenuatis, dense punctatis; pedibus sat validis. Long. 10 mill. Perse (coll. Pic). — Diffère de *Nacerdochroa caspia* Fald. par la forme plus allongée, la structure du prothorax, les élytres à pourtour plus clair. Je ne connais pas en nature *Z. turcomanica* Sem., ce dernier aurait une autre coloration et un aspect non brillant.

Le genre *Pseudanæsthetis* Pic, récemment publié (*Casopis* 25, II, 1929, p. 119), quoique décrit depuis longtemps, est préoccupé par *Pseudanæsthetis* Pic (*Mél.* 37, 1922, p. 15), et devra prendre le nom de *Anæsthetomorphus*.

Récemment (*Entom. Blätter* 31, 1929, p. 32) Plavilstshikov a écrit un long article sur le genre *Pogonochærus* Gem., où il est question des *P. Eugeniæ* Gglb., *taygetanus* Pic et *griseus* Pic, compris autrement que par moi-même. Mes observations correctives antérieures (*Entom. Blätter* 1927, p. 66), ayant été appuyées par l'examen de plusieurs types et d'un co-type de feu Ganglbauer (insecte muni d'une étiquette de la main de l'auteur qui, de son vivant, n'avait pas la réputation de déterminer à tort et à travers), je maintiens ma façon de voir, la jugeant plus sérieuse que celle d'un critique qui forme plutôt son jugement à l'aide de textes interprétés de façon plus ou moins exacte.

Elytres d'un jaune rougeâtre ou d'un rouge brunâtre avec les dessins suivants : bordure basale, qui entoure l'écusson, manque parfois ; deux taches antérieures, l'une humérale, allongée, étroite au milieu et élargie au bout, parfois cette tache s'interrompt au milieu, l'autre arrondie près de la suture ; deux fascies transversales, complètes, l'une médiane, dentée au-dessus, échancrée au-dessous, l'autre antéapicale, dentée au-dessus, la dernière se réunit avec la fascie médiane par une ligne suturale, et, enfin, le liséré apical plus ou moins large, qui, enveloppant tout le bout, se prolonge par la suture et par le bord latéral et se réunit avec la fascie antéapicale ; parfois la dernière, confluyente avec le liséré apical, forme une large bordure apicale qui occupe 1/4 des élytres (ab. a) ou fascie médiane remplacée par une tache diffuse près du bord latéral (ab. b). Long. 13 mm., larg. presque 3 mm.

Par la forme de la taille et par la position des taches antérieures et de la fascie antéapicale sur les élytres ressemble beaucoup à la *M. polymorpha zebraea* Mrs var.

Boukhara orient. ; Mouninabad (M. Régel, iv 1883). 8 exempl. dans ma collection.

### ***Mylabris polymorpha zebraea* m. *brevifasciata* m. n.**

Tête, antennes et pronotum de la même forme que dans *M. zebraea* Mrs. Elytres d'un jaune brunâtre, ornées de dessins noirs : bordure basale qui entoure l'écusson ; deux taches antérieures, l'une humérale, allongée, réunie avec la bordure basale, l'autre arrondie près de la suture ; deux fascies raccourcies au-dedans, l'une médiane, dentelée, l'autre antéapicale, dentelée au-dessus et liséré apical, qui, enveloppant toute l'extrémité des élytres, se réunit avec la fascie antéapicale sur la suture et sur le bord latéral ; parfois les taches humérale et suturale réunies ensemble (ab. a) ou fascie antéapicale atteignant la suture (ab. b). Long. 10-13 mm.

Transcaucase : Steppe Mûgan (M. A. Zawadsky, 22 v 1901) ; G. Sach-Cinar distr. ; Kirjagen ; stat. Udschari (G. Soumakov, 15 vi 1902) ; Elisavetpol, 8 exemplaires dans ma collection.

### ***Mylabris semifasciata* Pic**

Zon. *18-punctata* var. *semifasciata* Pic. *L'Echange*, XI, 1895, p. 81. — *Myl. bicolorrepilosa*. — Soum. *Rev. Russ. d'Ent.* XIII, 1914, pp 473 et 474. — Ab. a, = var. *semifasciata* Pic. Sum. *Horae S. Ent. Ross.* XLII, 1915, p. 52.

Cette espèce nommée *Z. 18-punctata* var. *semifasciata* a été décrite par M. Pic en 1895 et *Z. 18-punctata* Klg. = *19-punctata* Ol. rentre dans le groupe *Decapotoma* Voig. (sous-genre de *Marseul*) dont les représentants ont des antennes avec seulement dix articles, tandis que les antennes de var. *semifasciata*, qui, à tort, fut inclus dans cette espèce, ont onze articles. Cette dernière variété représente la même espèce que celle décrite par moi en 1914 et nommée *M. bicolorrepilosa*. La différence des deux est seulement dans les taches au milieu et devant le bout des élytres, qui sont unies l'une à l'autre. Je juge que var. *semistriata* Pic est une espèce, mais *M. bicolorrepilosa* Sum., décrite plus tard, est une aberration de cette espèce.

### ***Mylabris geminata kuschakewitschi* DOKH.**

Zon. *kouschakiewitschi* Dokt. *Hor. S. E. Ross.*, XXIV 1889, p. 167, t. II, f. 64. — Zon. *satanula* Reitt. in. litt.

Tout l'insecte est d'un noir uniforme, brillant. Elytres assez grossièrement ponctuées, assez densément recouvertes de poils noirs assez courts. Long. 7 mm.

HORS-TEXTE DE *L'Echange*, n° 436 — 1929.

En comparant *Z. kouschakiewitschi* Dokh. avec *M. geminata hauseri* Eschr. (*Hor. Soc. E. Ross.*, XLII, 1915, p. 16), je n'ai pas remarqué entre eux une telle différence, d'après laquelle on pourrait les compter pour les sous-espèces différentes, — c'est pourquoi je regarde la *Z. kouschakiewitschi* Dokh. comme sous-espèce (*kuschakiewitschi* Dokh.) et la *M. geminata hauseri* Eschr., décrite plus tard, comme sa morphé.

***Mylabris staudingeri m. apicetenuimarginata* SUM.**

*M. staudingeri* var. *apicetenuimarginata* Sum., *Rev. Russ. d'Ent.*, XIII, 1914, p. 304, f. 2. — *M. staudingeri* var. *apicetenuipunctata* Sum., *Hor. Soc. E. Ross.* XLII, 1915, p. 10.

Cette morphé a été par erreur attribuée à *M. lucens* Eschr., comme variété, et le nom de cette variété a été dénaturé à l'impression: au lieu de *apicelenuepunctata* il faut lire: *apicetenuimarginata*.

***Mylabris italica* SUM. sp. n.**

Par la forme du pronotum ressemble beaucoup à la *M. quadripunctata* L., par la position et le nombre de taches à la *M. fabricii m. crocata* Pall.

Dessous du corps, tête, et pronotum noirs, couverts de poils noirs, dressés. Tête finement et densément ponctuée, avec une carène au milieu. Antennes noires, assez longues, 3<sup>e</sup> article deux fois plus long que 4<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>-6<sup>e</sup> de longueur égale, 7<sup>e</sup>-11<sup>e</sup> graduellement élargis vers l'extrémité, formant une sorte de massue, le dernier article ovalaire, aussi long que les deux précédents ensemble. Pronotum assez finement et assez densément ponctué, médiocrement convexe sur le dos, avec une bosse au milieu à peine visible, droit sur les côtés, peu rétréci en avant. Elytres rouges-brunâtres, garnies de poils noirs, couchés sauf le premier tiers qui est couvert de poils dressés, ornées de six taches (2, 2, 2) noires: deux taches antérieures ovalaires, l'une externe assez grande, l'autre interne petite; deux taches médianes, l'une latérale grande et l'autre interne petite, et deux taches antéapicales très petites. Pattes noires; épine externe des tibias postérieurs en forme de bâton, épine interne-aiguë à l'extrémité. Long. 12 mm., largeur (sur la base des élytres) 3 mm.

Italia: Basilicata, monte Valtorino (A. Fiori, 10 vi 1898). 1 exempl. dans ma collection.

***Mylabris externepunctata m. dagestanica* SUM. morpha nova.**

Pronotum très finement et très rarement ponctué, couvert de poils grisâtres, courts, couchés, et de poils noirs, plus longs, dressés. Elytres jaunes-testacées, ornées de dessins noirs: deux taches antérieures, l'une humérale oblongue, l'autre suturale anguleuse touche la suture et se prolonge par la suture en forme de ligne, jusqu'à l'écusson; une fascie médiane, avec une dent au-dessus, ondulée au-dessous, complète, et deux taches antéapicales, qui se réunissent ensemble, formant une fascie transversale. Long. 8 mm., larg. 2 mm.

Caucase: Derbent. un exempl. dans ma collection.

***Mylabris splendidula* PALL.**

Icones Inš. 1781, p. 83, tab. E, t. 8.

Forme typique. Elytres bleues avec dessin d'un jaune-testacé: fascies médiane et antéapicale confluentes le long de la suture.

**Ab. e nova (1).** — Elytres d'un jaune-testacé avec un dessin noire bleuâtre: deux taches antérieures qui, confluant ensemble, forment une fascie, et deux fascies transversales, complètes, l'une médiane, l'autre apicale.

**Ab. e. nova.** — Elytres d'un jaune-brun avec un dessin noir-bleuâtre: une tache humérale, une fascie postmédiane, remplacée par quelques petites taches vagues comme vestige de cette fascie, et une ligne bordant l'extrémité.

**Mylabris olivieri** BILB.

Mon. Myl. 1843, p. 71, t. VII, f. 13

Forme typique. Deux, ou trois, articles des antennes brunâtres. Elytres jaunes-pâles, la base et le bout rougeâtres, avec dessins noirs: deux taches antérieures arrondies, une fascie bi-sinuée au-delà du milieu, et une fascie subapicale plus ou moins raccourcie, surtout en dehors.

**Ab. c nova (2).** — Deux taches antérieures réunies ensemble, formant une fascie transversale; une fascie médiane se réunissant avec une fascie antéapicale par une ou deux lignes longitudinales; fascie antéapicale prolongée sur la suture, bordant toute l'extrémité.

**Mylabris undecimnotata m. crux** ESCHR.

Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 103, t. II, ff. a, b.

Forme type. Elytres d'un jaune-pâle-rosâtre avec trois fascies transversales: antérieure, médiane et antéapicale.

**Ab. b nova (3).** — Fascie antérieure se réunissant avec une fascie médiane et cette dernière avec une fascie antéapicale.

**Mylabris geminata v. fenestrata** PUEL.

L'Echang, XXIII, 1907, pp. 115-119

Sous ce nom a été déjà décrite par M. Escherich une variation de *M. frolovi*. A cause de la coïncidence des noms j'ai donné à cette variation un nouveau nom: v. *fenestrata* Puel = v. *pueli* n. n.

G. SOUMACOV.

**CORRECTIONS**

Page 2, au lieu de Fedschen, lire *Tedschen*.

Page 2, au lieu de Dechisak, lire *Dschisak*.

Page 3, au lieu de Gaudan, 5000<sup>m</sup>, lire 5000 *pieds*.

(1) **Ab. a, b, c, d**, SUM. « Les espèces pal. du genre Myl. » *Hor. S. E. Ross.*, XLII, 1915, p. 10.

(2) **Ab. a, b l. c.**, p. 22.

(3) **Ab. a**, = v. *opulenta* ESCHR. *l. c.*, p. 17.

Pour m'éviter de perdre un temps précieux à discuter *tarse à tarse* avec un collègue qui se montre acharné à vouloir obtenir toujours le dernier mot, je coupe sagement court à une polémique qui risquerait de s'éterniser.

(A suivre.)

M. Pic.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

*Mordella albosuturalis* Pic (1927), préoccupé par *M. albosuturalis* Lilj. (1922) devra prendre le nom de *sumatrana*.

*Genecerus uniformis* v. nov. *bicolor* ♂. Elongatus, nitidus, cinereo, parum dense et uniformiter, pubescens, nigro-piceus, aut brunneus, pectore aliquot pro parte elytrisque, his ad basim paulo obscuris, pallidioribus, mandibulis, palpis antennisque testaceis, pedibus testaceis, pro parte brunneis; antennis longe pectinatis; capite inter oculos biimpresso, minute et diverse punctato; thorace breve, sat lato, antice attenuato, angulis posticis fere rectis, linea glabra mediana, minute punctato, postice lateraliter subcarinato; elytris elongatis, obsolete et multi costulatis, apice attenuatis et ad suturam paulo dehiscentibus. Long. 10-12 mill. Soudan Egyptien (in British Museum et coll. Pic). Diffère de *uniformis* Bourg. (ex description), au moins par la coloration non uniforme et la punctuation fine de la tête.

*Dictyopterus angustatus* n. sp. Elongatus, sat angustatus, opacus, niger, supra, articulis tribus primis antennarum pedibusque purpureis; antennis parum gracilibus, articula 3° secundo longiore et latiore; thorace parum lato, 5 areato; elytris elongatis, 4 costatis, costa tertia valde elevata, intervallis uni fenestrato-punctatis. Long. 8 mill. Tonkin (coll. Pic). — Très distinct de *4-costatis* Pic, par la 3° côte surélevée, les angles postérieurs du prothorax plus courts, la coloration plus pourprée.

*Theca africana* n. sp. Oblongus, parum latus, nitidus, griseo aut luteo pubescens et parum longe hirsutus, nigro-metallicus, membris vage rufescentibus; thorace breve et lato, antice attenuato, fortiter, in disco sparse, punctato; elytris sat brevibus, apice attenuatis, humeris prominulis, striato-punctatis, lateraliter valde fortiter, ad scutellum impunctatis, intervallis subplanatis, minute punctatis. Long. 3 mill. Cameroun (coll. Pic). — Diffère de *maxima* Pic, par la taille moindre, la forme plus élargie, la punctuation plus fine des intervalles.

*Gastrallus laticollis* n. sp. Elongatus, testaceus, aut rufo-testaceus, parum nitidus, capite thoraceque aliquot subopacis, pube pruinosa sat dense tectus; capite thoraceque granulosus, elytris sat distincte striatis; antennis brevibus, 10 articulatis, articulis tribus ultimis valde elongatis; thorace robusto, elytris paulo latiore, antice attenuato, lateraliter subsinuato, angulis posticis latis et prominulis, medio postice aliquot sulcatulo; elytris elongatis, distincte, lateraliter fortiore, striatis. Long. 3,5-4 mill. Singapore (G. H. Corbett, in British Museum et coll. Pic). — Sans doute voisin de *indicus* Reitt. (ex description), antennes moins courtes, élytres à stries plus ou moins complètes, prothorax probablement plus robuste.



Je regarde, comme ♂ de cette espèce, des exemplaires à prothorax moins robuste, non sensiblement plus large que les élytres et à antennes bien plus longues.

**Asclera nigroapicalis** n. sp. Parum elongatus, pro parte opacus, griseo pubescens, niger, mandibulis, pedibus infra, corpore pro parte, scutello elytrisque testaceis, his apice nigro notatis; thorace rubro, in disco profunde biimpresso, sat breve, antice dilatato; elytris dense punctatis, in disco vage bicostulatis. Long. 9 mill. Brésil (coll. Pic). — Voisin de *nigro notata* Pic, en diffère par la tête foncée et les élytres dépourvues de macule humérale noire.

L'espèce décrite sous le nom de *Asclera suturalis* Fleut. Sallé (*An. Soc. Ent. Fr.* 1898, p. 434), de la Guadeloupe, me semble devoir rentrer dans le genre *Micronacerdes* Pic (1923). La variété nouvelle **Dufau** a le prothorax marqué de noir. Guadeloupe (Dufau, in coll. Pic).

**Themus crassipes** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, antennis apice, elytris pedibusque nigris, femoribus ad basim diverse rufis; thorace sat breve et lato; elytris thorace paulo latioribus, lateraliter sinuatis, apice attenuatis, supra inæqualibus, pro parte impressis, inæquale punctatis; pedibus brevibus et robustis. Long. 20 mill. Tonkin (coll. Pic). — Voisin de *violaceipennis* Gorh., en diffère par les élytres noires plus inégales, les pattes plus robustes.

**Themus rugosus**. n. sp. Angustatus, apice valde et longe attenuatus, griseo pubescens, rufus elytris viridibus, femoribus apice, tarsis, tibiis anticis et intermediis totis, posticis apice nigro-cyaneis; thorace fere quadrato; elytris valde elongatis, subsinuatis, apice valde attenuatis, supra paulo impressis, fortiter et dense ruguloso-punctatis; pedibus parum elongatis. Long. 17 mill. Chine: Fokien (coll. Pic). — Voisin de *coelestis* Gorh., plus étroit, élytres plus atténuées postérieurement, à sculpture plus forte.

(A suivre.)

M. PIC.

## Sur *Chauliognathus subapicalis* Pic

Par M. PIC

Je possède une série d'insectes procurés par M. Le Mout, tous originaires d'une unique localité: Uberada, au Brésil, et évidemment capturés ensemble, dont l'étude m'a fait conclure à une seule unité spécifique. Cette unique espèce, très variable de coloration, et dont plusieurs nuances, originaires du Brésil, ont déjà été nommées par moi au titre spécifique, comprend les principales variétés groupées dans le synopsis qui suit. L'espèce est de forme un peu allongée, atténuée postérieurement, le dessous du corps est variablement foncé ou marqué de clair, les membres foncés ou avec les cuisses rembrunies à la base, la tête noire est marquée de jaune ou de roux en avant, le prothorax orangé, d'ordinaire diversement marqué de foncé sur le disque et postérieurement; la partie postérieure des élytres est, soit entièrement noire, soit avec une macule apicale, ou bordure, orangée.

1. Prothorax marqué diversement de foncé sur le disque.

2

— Prothorax concolore, orangé. Ecusson et élytres largement orangés en avant avec la partie postérieure noire.

var. nov. **innotatus**.

(A suivre.)

M. PIC.

## Félicitations, Renseignements, Avis

---

Beaucoup de nos abonnés de « L'Echange » étant, en même temps, ceux de « *Miscellanea Entomologica* », le Directeur, M. Pic, a le devoir de confirmer, en leur nom, au Directeur, E. Barthe, la joie bien vive ressentie par tous pour la récente attribution du *Prix Dollfus*, avec de sincères félicitations pour cette distinction estimée si bien méritée, et surtout obtenue, ce qui est plutôt rarissime, par l'unanimité des suffrages.

Ce vote calme et paisible répond, je crois, mieux à l'esprit du fondateur que certains, *plus qu'agités*, ayant eu lieu autrefois, et où l'esprit de jalousie, poussé à la dernière limite, voulait *avant tout* avoir le dernier (et *mauvais*) mot, au détriment de toute autre considération sérieuse.

Cet esprit de parti pris, bien en baisse de nos jours, n'est malheureusement pas complètement aboli, et, dans d'autres circonstances, on peut en remarquer encore quelques manifestations précises. Je n'insiste pas sur ce sujet délicat.

Sur la couverture du dernier numéro de ce journal, le directeur de « L'Echange » avait annoncé, en l'honneur du prochain centenaire de la Société Entomologique de France, un projet de fondation de prix. Ce prix aurait été attribué *seulement* à un imprimé, ou manuscrit, rédigé suivant la conception *varietiste*, c'est-à-dire avec *nominat*ion des principales modifications de l'espèce. Le *Conseil* de cette Société n'a pas cru devoir accepter cette proposition, ce qui n'a pas trop surpris son promoteur instruit par une longue expérience.

*L'antivariétisme* ne désarme jamais et critique avec constance toujours, poursuivant partout son œuvre de démolition, ou d'obstruction systématique. La fondation d'un prix varietiste, c'est de la propagande, *pas autre chose*, en faveur du système abhorré, alors il n'en faut pas. Ne cherchons pas d'autre raison d'un rejet; ce sera sage et d'un esprit réfléchi.

Le rejet du prix offert est un échec d'idées et non pas personnel; il n'y a pas lieu d'en dramatiser le résultat et surtout d'en conclure que le varietisme a reçu ainsi un coup dont il aura peine à se relever. La philosophie bien trempée du varietiste de vieille date dénommé Pic, lui permet de regarder dans l'avenir sans crainte, ni remords, et surtout lui donne le droit de ne pas renoncer à ses idées qu'il sait (pas seulement combattues par certains) partagées par de nombreux entomologistes de diverses nationalités.

En 1932, il y aura, en France, non seulement le centenaire de la Société Entomologique de France, mais aussi un Congrès international d'Entomologie; il peut sembler assez logique de reprendre en l'honneur de ce dernier un projet avorté en faveur du premier. On en reparlera plus tard et, à ce propos, les bons conseils seront les bien venus à la direction de « L'Echange ». Nous avons toute l'année courante devant nous.

Prière aux abonnés en retard de régler, sans plus attendre, leur abonnement pour 1929, soit 7 francs pour la France et 12 francs pour l'étranger, adressé à M. Maurice Pic. Il ne sera pas envoyé de traite et l'envoi du journal sera interrompu pour ceux n'ayant pas encore payé leur abonnement.

Ont payé leur abonnement, pour 1929, en plus des abonnés précédemment cités: MM. Dr Auzat, Boulet, Dalibert, Dauphin, Fagniez, Falcoz, Ferée-d'Arcourt, Florer, Hardy, Hustache, Institut Cherifien, Marcot, Museum de Tring, Rolland, Dr Sicard, Soumakov, Théry, Testout, de Touzalin, Clermont, Corporaal, Porta, Dr Heyrovsky.

M. Maurice Pic, à Digoin, ou à Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire), est disposé à échanger des *separata* de ses articles avec d'autres entomologistes publicistes, étrangers principalement. Il désire principalement tout article (et le recevoir sans tarder) où il est question d'espèces ou de variétés *nouvelles* de la famille des *Malacodermes*, cela en vue de la rédaction de cette famille pour le « *Coleopterorum Catalogus* », dont les *Melyrinae* viennent de paraître.

---