

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (O. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodius paléarctiques, Histéridés français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Evolytides, Phalacrides, Lathridiides.*

Maurice PIC, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridés, Ptilinidés, Nanophyes, Anthicidés, Pedilidés, Cryptocecidés, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques. Malacodesmes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e)
Coléoptères de France (Cuvellionides exceptés.)

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Digoïn

(2 Août 1929)

SOMMAIRE

Notes diverses, nouveautés, par M. Pic (suite).

Sur *Chauliognatus subapicalis* Pic (suite et fin), par M. Pic

Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France : 7 francs. | Étranger : 12 francs.

MOULINS
LES IMPRIMERIES RÉUNIES
15, RUE D'ENGHEN 15

ANNONCES

La page	32 fr.	Le 1/4 de page	10 fr.
La 1/2 page	18 fr.	Le 1/8 de page	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.) les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 20 juin 1929 54 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Payement à l'avance. Frais de port en plus.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages)	20 fr.
Edition réduite	10 fr.
Annonces seules	5 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN
(Haute-Garonne).

Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, nouveautés

PAR M. PIC

Telopes brunneonotatus v. nov. subelongatus. Diffère des types par la forme plus allongée, le prothorax roussâtre. Les élytres sont ornées seulement de quelques macules postérieures foncées. Égypte (coll. Pic).

Grammoptera ingrlica v. nov. diversipes. Pedibus intermediis et posticis nigris. Sibérie (coll. Pic). — Diffère, à première vue, de la nuance typique par les pattes antérieures restant seules testacées.

Rhamnusium salicis v. nov. Aubei. Prothorax plus ou moins foncé sur le disque. — Figure dans la collection Aubé.

Callimus abdominalis v. nov. diversipes. ♀. Femoribus latè rufis. Sainte-Baume (Pic). La forme typique a les pattes entièrement foncées.

Compsodorcadion politum v. nov. basicorne. Pedibus et articulo 1^o antennarum rufis. Altaï (coll. Pic).

Dorcadion Weiratheri (nov.). Elongatus, sat angustatus, niger, nigro aut fusco pubescens, elytris in disco griseo bilineatis, lineis antice et postice junctis, sutura albo pubescens, his lateraliter late griseo marginatis, antennis pro parte pedibusque diverse rufis; thorace breve, parum lato, lateraliter tuberculato, medio griseo lineato, ruguloso-punctato, pro parte dense pubescente. Long. 13-14 mill. Grèce: Chelmos (Weirather in coll. Pic et Weirather). — Diffère de *moreanum* Pic, au moins comme variété, par la forme un peu plus allongée, l'absence, sur les élytres, de courte bande blanche près de l'écusson, et par les bandes jointes postérieurement.

Dorcadion crux Billb. Aux variétés déjà publiées de cette espèce, on peut ajouter les nouvelles suivantes, originaires d'Asie-M^{re} et figurant dans ma collection: var. **brevedisjunctum** ♀. Facia lata albida elytrorum, antice medio reducte nigro lineata. — Voisine de la var. *integrofasciatum* Dan., mais avec la large bande pubescente blanche non complète, ornée antérieurement d'une ligne foncée.

Var. **lateargenteum** ♀. Dense et uniformiter albo argenteo pubescens, elytris ad suturam parum distincte multi nigro maculatis. — Voisine de la v. *niveopictum* Dan.

Phytæcia pustulata v. nov. macedonica. Antennis corpore longioribus, pro parte rufis, tibiis intermediis et posticis pro parte rufo tinctis. Macédoine (coll. Pic). — Diffère de la forme typique par ses longues antennes et la coloration non entièrement foncée des tibias intermédiaires et postérieurs.

Phytonomus Theresæ (nov.) (1). Parum elongatus, elytris paulo latis, niger, sat dense et simplice fulvo aut grisescente squamulatus et albo setosus; antennis rufis,

(1) Je donne ici une diagnose abrégée de cette nouveauté, qui sera décrite ultérieurement dans un article spécial portant le titre: « Notes sur les *Hyperini*. »

clava brunnescens. Long. 6 mill. Mont-Dore (Pic). — Diffère de *P. fasciculatus* Boh., par le rostre plus long, le prothorax moins court, et le revêtement presque uniforme des élytres.

Nanophyes atritarsis Pic (1). J'ai décrit ce *Nanophyes* en 1925. (*L'Ech.*, n° 422, p. 13), originaire d'Égypte, comme variété de *N. latifrons* Pic ; mais, en réalité, c'est une espèce propre caractérisée principalement par ses cuisses antérieures inermes et sa pubescence plus squamuleuse. Le *N. latifrons* Pic a les cuisses antérieures très robustes et multidentées.

Nanophyes languidus v. nov. **pectoralis**. Rufo-testaceis, elytris pallidis, ad scutellum albo lineatis. Jéricho (Pic). — Diffère de *languidus* Boh. (ex description) par la pubescence des élytres non uniformément disposée et la poitrine rousse.

Nanophyes (Corimalia) maculaticeps n. sp. Oblongus, nitidus, flavus, capite postice et femoribus diverse nigro notatis ; rostro elongato, parum curvato, oculis grandis, non prominulis, sat distantibus ; antennis gracilibus, funiculis 5 articulatis, clava elongata, apice acuminata ; thorace obconico, albo trilineato ; elytris oblongis, postice attenuatis, fortiter striatis, ad scutellum albo notatis ; humeris sat dense pubescentibus ; pedibus elongatis, femoribus nigro tridentatis ; infra corpore pallido, pectore nigro notato. Long. 3 mill. Hongrie (coll. Pic). — Très voisin de *languidus* Boh., en diffère, à première vue, par la tête et les cuisses marquées de foncé.

Nanophyes (Corimalia) unidentatus n. sp. Minutus, oblongus, nitidus, longe griseo pubescens, pallidus, capite thoraceque rufis, pro parte obscuris, clava et infra corpore pro parte nigris ; rostro elongato, fere recto, oculis approximatis ; funiculis 4 articulatis ; thorace sat lato, antice attenuato ; elytris sat latis et brevibus, apice attenuatis, striatis, mediocre pubescentibus ; femoribus anticis sat gracilibus, minute unidentatis. — La var. nov. *tepensis* a l'avant-corps noir et les pattes en partie rembrunies. Long. 1 mill. environ. Caucase (coll. Pic). — Voisin de *pallidulus* Grav., et s'en distinguant, à première vue, par ses cuisses antérieures munies d'une petite dent.

(A suivre.)

M. PIC.

Sur Chauliognathus subapicalis Pic

(Suite et fin.)

PAR M. PIC

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2. Elytres largement et diversement orangées sur leur moitié antérieure | 7 |
| — Elytres noires ou en majeure partie noires. | 3 |
| 3. Elytres brièvement et diversement marquées d'orangé antérieurement. | 5 |
| — Elytres noires, sans teinte orangée basale. | 4 |
| 4. Une petite macule apicale orangée. | var. nov. <i>uberabanus</i> . |
| — Pas de macule apicale orangée. | v. <i>atrimembris</i> Pic. |
| 5. Pas de macule apicale orangée | 6 |
| — Une macule apicale orangée, en plus d'une bande basale étroite | var. nov. <i>reducteapicalis</i> . |

(1) Cette note, rédigée il y a plusieurs mois, paraît tardivement, mais elle n'en conserve pas moins son intérêt primitif étant écrite antérieurement à la rédaction de la description de *N. muticus* Peyer. (synonyme par la loi de priorité). Je reparlerai de cet insecte, d'autre part, avec plus de détails.

Bruchodrilus opaqipennis v. **nov. robustior**. Parum gracilis, rufus, antennis pro parte, thorace medio parum lato, illo robusto elytrisque pro parte intus, brunneo-piceis, illis sat latis et brevibus. Paragwey (in coll. Hicker). — Diffère de la forme type, par le prothorax plus robuste, les élytres un peu plus courtes, la coloration moins foncée des diverses parties du corps en dessus, notamment par les élytres en partie claires sur les côtés et à l'apex.

Curtodrilus elongatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger; thorace lato, medio elevato; elytris elongatis, multi costatis. Long. 5-6 mill. Tonkin. Lao Key. — Diffère, à première vue, de *niger* Pic par le prothorax plus large et la forme plus allongée.

Flabellotreta javana n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo-pubescent, niger, capite, thorace scutelloque rufis, elytris nigris, ad humeros rufo notatis; antennis parum gracilibus, longe flabellatis; thorace breve et lato, medio depresso; elytris thorace non latioribus, ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis, dense ruguloso-punctatis, indistincte costulatis. Long. 9 mill. Java. — Voisin de *obscuriceps* Pic, en diffère, à première vue, par la tête rousse et les élytres non subparallèles.

Attalus alienus n. sp. Elongatus, nitidus, parum pubescens et fere impunctatus, niger, elytris piceo-subpæneis, antennis sat robustis, ad basim, tibiis tarsisque testaceis; thorace breve et lato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, sat elongatis. Long. 3 mill. Bolivie. A placer près de *Germaini* Pic, coloration différente.

Dasytes abyssinicus n. sp. Angustatus, nitidus, griseo pubescens et longe fusco hirsutus, nigro-metallicus; antennis sat brevibus; capite inter oculos impresso, diverse punctato; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato et paulo marginato, paulo impresso, pro parte minute, pro parte fortiter et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, longissimis, apice subacuminatis, minute punctatis, pro parte granulosis, postice griseo subfasciatis et apice griseo notatis. Long. 5 mill. Abyssinie. — Ressemble un peu à *Delagrangi* Pic, mais plus étroit et très acuminé à l'apex.

Astylus sublunulatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, viridi-metallicus, elytris rufo-testaceo marginatis, in disco non recte rufo-testaceo lineatis, postice rufo-testaceo annulatis, aliquot non integre, apice diverse rufo-testaceo notatis; antennis ad basim pro parte rufis; capite parum elongato, dense punctato; thorace parum breve et lato, sparse punctato; elytris fortiter, dense et irregulariter punctatis, apice subacuminatis. Long. 7 mill. Pérou: Chanoyamayo (Wolcott, in British Museum et coll. Pic). — Voisin de *lineolatus* Pic, en diffère par les élytres moins allongées, ornées d'une lunule postérieure claire (parfois incomplète) enclosant une macule foncée et à ponctuation plus forte.

Malthodes Evansi n. sp. Latus, nitidus, parum pubescens, niger, antennis ad basim, capite antice, thorace et abdomine pro parte testaceis, pedibus nigris, femoribus apice tibiisque ad basim testaceis, elytris piceo-griseis, ad humeros externe testaceis, apice sulphureis; capite sat lato, parum punctato; thorace breve et lato, angulis, anticis latis et productis; elytris parum elongatis, apice subrotundatis. Long. 3,5 mill. Congo: Elisabethville (Dr Evans, in British Museum et coll. Pic). — Voisin de *ugendensis* Pic, en diffère, en outre de la coloration largement claire, par les antennes un peu plus longues et grêles.

M. Evansi v. **nov. Elisabethæ**. Niger, nitidus, articulis primis antennarum tibiisque

ad basim testaceis, Elisabethville (Dr Evans, in British Museum). — Diffère de Evansi Pic, en plus de la coloration générale foncée, par la forme moins robuste, le prothorax plus petit.

Kandyosilis n. gen. Antennis particularibus, articulo 5° difforme, dilatato, apice inciso et lamellato; thorace non inciso, lateraliter sinuato; unguibus fissis aut dentatis. — Genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, caractérisé par la structure antennaire; peut prendre place près de *Pseudosilis* Pic.

Kandyosilis Bryanti n. sp. Elongatus, subparallelus, parum pubescens, nitidus, niger, capite, thorace, scutello elytris ad basim breve, coxis et femoribus anticis rufo-testaceis, antennis ad basim infra rufo tinctis, articulo 2° elongato, 3° paulo crasso et brevior, 4° grande, dilatato et difforme, sequentibus elongatis et diverse gracilibus; thorace subquadrato, lateraliter sinuato, non inciso, medio sulcato; elytris thorace fere æqualibus, elongatis, subparallelis, ad basim paulo punctatis, postice subrugulosis; pedibus gracilibus. Long. 6,5-7 mill. Ceylan: Kandy (Bryant, in British Museum et coll. Pic). Petite espèce, caractérisée par sa structure antennaire, se rapprochant, par sa coloration, de *C. ceylonica* Pic.

Rhagonycha bifoveiceps n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, antennis, articulis primis exceptis, thorace medio postice, scutello elytrisque nigris; capite lato, inter oculos late bifoveolato, postice paulo attenuato; antennis gracilibus, elongatis; thorace parum elongato, supra inæquale; elytris diverse et minute ruguloso-punctatis. Long. 7 mill. Hoa Binh (ex de Cooman). — Espèce caractérisée par les fovéoles de sa tête jointes à sa coloration.

Rh. inæqualicornis n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, capite antice et abdomine apice testaceis, femoribus pro parte rufescentibus; capite opaco, parum lato, oculis prominulis; antennis nigris, infra pro parte testaceis, validis, articulo 2° breve, 3° elongato, 4° et sequentibus intus apice diverse prolongatis et subsinuatis, ultimis fere simplicibus; thorace elongato, supra inæquale; elytris diverse ruguloso-punctatis. Long. 5 mill. Hoa Binh. — Très distinct du précédent par la structure particulière des antennes, la tête moins grosse et non fovéolée, la coloration plus foncée.

Rh. semicostata n. sp. Parum elongatus, subnitidus, luteo pubescens, aurantiacus, capite membrisque, femoribus ad basim rufis exceptis, nigris; capite sat lato, postice non attenuato, antennis filiformibus; thorace subquadrato, medio impresso; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, dense ruguloso-punctatis et minute costulatis. Long. 9 mill. Hoa Binh. — Voisin de *albidipennis* Pic, mais moins brillant, avec la coloration différente, les élytres costulées.

Rh. tricolorata n. sp. Angustatus, nitidus, parum griseo-pubescens, niger, capite antice, antennis ad basim late, thorace, pectore pro parte, abdomine apice et femoribus ad basim testaceis, elytris cyaneo-metallicis; capite lato, postice paulo attenuato; antennis depressis, non dilatatis, articulis pro parte sulcatis; thorace elongato, medio postice depresso; elytris, thorace valde latioribus, dense ruguloso-punctatis. Long. 8 mill. Hoa Binh. — A placer près de *longiceps* Pic.

Cautires Coomani n. sp. ♂. Elongatus, opacus, nigro-piceus, thorace, illo paulo nitido, scutello elytrisque aurantiacis; antennis sat gracilibus, articulis 3 et sequen-

tibus ad basim plus minusve longe arcuate flabellatis; thorace 7 areolato, parum elongato, antice medio triangulariter prolongato, lateraliter paulo arcuato, angulis posticis parum prolongatis; elytris angustatis, intervallis sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 7 mill. Hoa Binh. — Voisin de *C. tonkineus* mihi, ce dernier ayant les antennes moins grêles, à rameaux flabellés, plus larges, le prothorax plus large, marqué de noir en arrière, n'ayant que 5 aréoles distinctes et l'écusson obscurci.

C. atrodiversus n. sp. ♂. Elongatus, opacus, niger, thorace pro parte elytrisque aurantiacis, his pro majore parte nigro-punctatis; antennis parum gracilibus, articulis 3 et sequentibus ad basim plus minusve longe et recte flabellatis; thorace 7 areolato, parum lato, antice sinuato, lateraliter fere recto; elytris elongatis, intervallis diverse, non regulariter, bifenestratis. Long. 11 mill. Tonkin. — Diffère de *Coomani* par la structure des antennes et le dessus marqué de noir.

C. minor n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, niger, thorace aurantiaco, postice nigro-notato, elytris pro parte nigris, pro parte diverse aurantiacis; antennis sat gracilibus et longe flabellatis ♂, aut subflabellatis ♀; thorace 7 areolato, antice sinuato, lateraliter fere recto; elytris non regulariter fenestrato-punctatis. Long. 5-6 mill. Tonkin. — Voisin des précédents.

Odontocerus Salvazai n. sp. Elongatus, opacus, niger, thorace aurantiaco, postice nigro notato, 5 areolato, illo sat transverso; antennis valde depressis et pectinatis. Long. 6 mill. Laos (ex Vitalis). — Très voisin de *notatithorax* Pic et s'en distinguant, à première vue, par le prothorax n'ayant que 5 aréoles.

Gladophorus congruens n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, nigro-piceus, capite pro parte rufescente, thorace, scutello elytrisque aurantiacis, pectore pro parte lateraliter coxisque testaceis, antennis sat gracilibus et diverse flabellatis, flabellis diverse articulatis; thorace 7 areolato, elongato, antice medio paulo prolongato, lateraliter fere recto; elytris elongatis et angustatis, sat regulariter fenestrato-punctatis. Long. 6-7 mill. Hoa Binh. — Voisin et distinct, à première vue, de *hoanus* Pic, par la structure du prothorax.

Bulenides inapicalis n. sp. Elongatus, opacus, niger, thorace et scutello aurantiacis, elytris rubro-aurantiacis; antennis crassis, valde depressis, longe pectinatis; thorace sat elongato et parum lato, angulis posticis prominulis, areola longissima, postice attenuata, carina antica parum brevis; intervallis elytrorum sat regulariter bifenestrato-punctatis. Long. 9 mill. Cochinchine. — Diffère de *testaceus* Pic, par la coloration un peu pourprée des élytres, l'aréole du prothorax plus longue, d'où carène de cet organe plus courte.

Phænolis vittaticollis n. sp. Oblongo elongatus, opacus, niger, thorace aurantiaco, medio nigro vittato, vitta antice attenuata, illo antice medio obconico, lateraliter subarcuato; elytris aurantiacis, apice late (ad suturam reducte) nigro notatis, his thorace non latoribus, subparallelis, apice attenuatis, lateraliter antice deplanatis, dense ruguloso punctatis, parum distincte costulatis. Long. 10 mill. Brésil. — Voisin de *basalis* Pic, prothorax différent, forme plus parallèle, élytres non marquées de noir à la base.

Aethra testaceicollis n. sp. Elongatus, opacus, testaceus, antennis nigris, articulis 2 primis et ramulis ultimis apice testaceis, elytris testaceis, intus late nigro vittatis, sutura antice testacea; antennis gracilibus; thorace transverso, antice subarcuato;

elytris thorace non latioribus, fortiter costatis, lateraliter pro parte deplanatis. Long. 6 mill. Pérou. — Espèce très distincte par sa coloration ; peut prendre place près de *lauta* E. Ol.

Ae. maculata n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, niger, articulo ultimò antennarum et thorace lateraliter testaceis, elytris nigris, in disco postice testaceo maculatis ; antennis parum gracilibus ; thorace parum lato, antice arcuato ; elytris thorace non latioribus, distincte costatis. Long. 7 mill. Colombie. — Plus robuste que le précédent avec les antennes moins grêles et la coloration différente.

Leucothrix aurantiaca n. sp. Elongatus, opacus, niger, antennis apice, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad suturam antice longe nigro notatis et antice externe costatis ; antennis deplanatis ; thorace parum elongato. Long. 8 mill. Pérou. — Espèce très distincte par sa coloration. A placer près de *peruana* Pic.

Le *L. binotata* mihi, du Pérou, voisin du précédent, a les élytres à côte externe moins nette et noires avec une macule humérale allongée et une médiane subtransversale orangées.

Dryptelitra apicalis n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, membris, femoribus et tibiis ad basim testaceis exceptis, segmentis tribus ultimis abdominis elytrisque apice sat late et lateraliter pro majore parte nigris. Long. 15 mill. Bogota. — Voisin de *plorans* E. Ol. type (1), en diffère par la bande foncée des élytres non discale et éloignée des épaules, les tibias bicolores, l'aspect plus brillant.

Ledocas proteus v. nov. Olivieri. Elytres entièrement orangées, sans dessins noirs. Vénézuëla.

Pyrogaster nigrolineatus n. sp. Elongatus, subopacus, niger, thorace aurantiaco, triangulariter nigro-notato ; elytris aurantiacis, apice late nigris, longitudinaliter diverse nigro vittatis, vitta presuturalis reducta, vitta discoïdalis integra ; antennis pro parte depressis. Long. 13 mill. Brésil. — Voisin de *multinotatus* Pic, plus étroit avec les dessins noirs des élytres différents.

Photuris Wagneri n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace, scutello, coxis et femoribus anticis intermediisque ad basim testaceis, abdomine rufo bimaculato. Long. 12 mill. Rép. Argentine. — Voisin de *blatoides* Cast. par sa forme et sa coloration, en diffère par le prothorax non maculé de foncé, les avant-derniers segments de l'abdomen seulement maculés de clair, etc.

P. Grandjeani n. sp. Angustatus, nitidus, pro parte ruguloso-punctatus, niger, thorace, coxis, femoribus pro majore parte et segmentibus penultimis abdominis testaceis, elytris rugulosis, nigris, ad suturam et lateraliter reducte albo marginatis. Long. 11 mill. Brésil. — A placer près de *lepida* E. Ol.

Diaphanes Coomani n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, pectore pro parte, femoribus ad basim, thorace, illo medio postice rubro, scutello elytrisque circa testaceis ; scutello valido, non breve, antice bigibboso ; elytris thorace paulo latioribus, subarcuatis, apice breve attenuatis, lateraliter paulo deplanatis, in disco costulatis, dense et minute ruguloso-punctatis ; abdomine apice pro parte flavo. Long. 9 mill. Hoa Binh. — Coloration de *fenestratella* Brg., mais tout autre par la forme non allongée, les élytres plus courtes et un peu élargies.

(1) Acquis récemment chez Clermont avec les *Lampyrides* de Grandjean.

6. Une bande basale étroite orangée complète. var. *luteobasalis* Pic.
 — Pas de bande basale complète, mais seulement une macule humérale orangée. var. nov. *humeralifer*.
7. Elytres sans macule, ni fascie, noire sur leur moitié antérieure orangée. 12
 — Elytres présentant, antérieurement, des dessins noirs variés sur coloration foncière orangée. 8
8. Dessins noirs isolés de la partie postérieure foncée. 10
 — Dessins noirs diversement joints à la partie postérieure foncée. 9
9. Une macule apicale orangée. var. nov. *diversus*.
 — Pas de macule apicale orangée. var. nov. *junctus*.
10. Elytres ayant chacune une macule noire isolée. 11
 — Elytres avec une fascie noire, commune aux deux étuis. var. *transversefasciatus* Pic.
11. Une macule apicale orangée. var. nov. *binotatipennis*.
 — Pas de macule apicale orangée. var. nov. *separatus*.
12. Une macule apicale orangée. (forme type) *subapicalis* Pic.
 — Pas de macule apicale orangée. var. nov. *basipennis*.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Plateros singularis n. sp. Angustatus, nitidus, paulo griseo pubescens, rufo-testaceus, elytris pallidioribus, abdomine nigro, membris pro majore parte nigris. Antennis hirsuto pilosis, nigris, articulo 1° infra et ultimis paulo testaceis, articulo 2° minute, 3° valido, triangulariter dilatato, 4° paulo latiore, sequentibus paulo elongatis et minus latis, apice angulatis, ultimis subcylindricis; capite cum oculos valido, paulo prominulo, inter oculos impresso; thorace elongato, antice medio subacuminato arcuato, lateraliter postice distincte strangulato, angulis posticis valde prominulis, medio postice sulcato; elytris thorace parum distincte latioribus, sat elongatis, externe plicatis, ad humeros non carinatis, regulariter costulatis et punctatis; pedibus nigris, femoribus ad basim rufo-testaceis; pectore rufo-testaceo, abdomine nigro. Long. 7 mill. Bornéo (communiqué par Kleine). — Espèce caractérisée par son prothorax particulier, plus allongé et plus étranglé que d'ordinaire, les antennes bicolores et en partie triangulairement dentées. Sans doute voisin de *P. pallidulus* Klein.

Microditoneces brevelineatus Pic var. Niger, thorace circa elytris que testaceis (v. nov. *inlineatus*), his apice aliquot sat late nigris (v. nov. *Staudingeri*); antennis parum validis, subdentatis; thorace antice medio arcuato, angulis posticis paulo prominulis. Ile Banguey.

Calyptocephalus notaticollis n. sp. Minutus, subparallelus, opacus, niger, thorace externe luteo lineato et postice late rubro notato, geniculis flavis, trochanteribus et infra corpore antice rubro-notatis; antennis brevibus, late biflabellatis; thorace subquadrato, antice medio paulo prominulo, lateraliter fere recto et late marginato, for-

titer non sparse punctato; elytris thorace parum distincte latioribus, ad suturam medio non rectis, apice paulo attenuatis, pro parte granulosis, abdomine nigro-piceo, apice paulo testaceo notato, medio longe lobato; pygidio nigro, lato, apice sinuato. Long. 8 mill. Paraguay (in coll. Hicker). — Voisin de *hilaris* E. Ol. et distinct, à première vue, par le prothorax marqué de noir.

Atyphella undulata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, flavo-testaceus, capite, antennis tarsisque nigris, scutello piceo maculato; elytris flavis, antice oblique brunneo undulato-fasciatis, fascia signaturis nigris ornata et ante apicem transverse piceo diverse trimaculatis, macula externa maxima; thorace lato, supra inæquale, medio dense foveolato-punctato, lateraliter sinuato, angulis posticis postice valde prominulis; elytris parum, latis, obsolete bicostatis, minute et dense punctatis; abdomine flavo. Long. 13 mill. N^o Guinée (in coll. Hicker). — Voisin de *peculiaris* E. Ol. et distinct, à première vue, par la présence d'une fascie très ondulée antérieure et de macules postérieures foncées sur chaque élytre.

Tomoderus semiæneus n. sp. Oblongus, robustus, nitidus, parum pubescens, rufescens, elytris rufo-æneis, membris bicoloribus; capite lato, parum punctato, antennis validis, nigris, articulis pro parte globulosis, articulis 2 primis rufis et elongatis; thorace elongato, antice valde dilatato, ante basim fortiter et dense punctato; elytris latis, humeris prominulis, sat elongatis, parum fortiter et irregulariter punctatis; pedibus testaceis, femoribus apice late tibiisque, apice excepto, rufo-brunneis. Long. 4 mill. Tonkin: Hoa Binh (1). — Espèce distincte par sa taille avantageuse jointe à sa coloration.

Hylophilus ruficornis n. sp. Oblongus, fere opacus, dense griseo pubescens, rufus, capite femoribusque posticis nigris, elytris rufis, ad basim et ante apicem piceo fasciatis et ad medium piceo undulato-fasciatis; capite postice truncato, oculis magnis, distantibus; antennis sat crassis et parum elongatis; thorace breve, supra inæquale, dense punctato, antice lateraliter subtuberculato; elytris latis et brevibus ruguloso-punctatis; pedibus posticis brevibus, femoribus parum crassis, anticis gracilibus. Long. 1,5 mill. Hoa Binh. — Voisin de *brunneofasciatus* Pic, moins allongé, fascie médiane plus longuement ondulée et tête foncée.

Hylophilus subscutellaris n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo hirsutus, niger, thorace rufo, elytris nigris, ad humeros oblique et apice late, testaceis; capite postice truncato, oculis magnis, sat distantibus, fortiter punctato; antennis validis et elongatis; thorace breve et lato, lateraliter antice non angulato, dense punctato; elytris parum latis et elongatis, fortiter et dense punctatis; pedibus parum validis, testaceis. Long. 2 mill. Hoa Binh. — Voisin de *Coomani* Pic, et distinct, à première vue, par ses élytres à dessins noirs.

Spermophagus atroapicalis n. sp. Subovatus, nitidus, niger, griseo pubescens, minute et sparse albo maculatus, elytris apice arcuate nigro denudatis, spinis tibiarum rufis. Long. 3 mill. Hoa Binh. — Voisin de *multinotatus* Pic, en diffère, à première vue, ainsi d'ailleurs que des autres espèces voisines, par la présence, sur les élytres, d'une macule glabre noire, subarquée en avant.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) Reçu du R. P. de Cooman ainsi que les suivants

Avis importants et Renseignements divers

Il a été annoncé précédemment, sur la couverture du journal, l'intention du directeur de l'*Echange* de fonder un prix d'entomologie. Voici quelques nouvelles indications à ce propos: Ce prix, qui s'appellera Prix Thérèse (c'est-à-dire du nom de la fidèle collaboratrice et dévouée secrétaire du Directeur) serait exceptionnellement décerné par l'intermédiaire du journal l'*Echange*, en 1932, au moment du Congrès international d'Entomologie. Il restera à discuter les clauses indispensables du concours et à dresser son règlement définitif (et à ce propos, les avis et conseils seront favorablement accueillis à la direction de l'*Echange*), mais, dès à présent, on peut dire quelques mots sur les grandes lignes de ce projet.

Le Directeur de l'*Echange* s'engage à verser en 1932, dans la caisse du journal, une somme de 500 fr. pour être répartie de la façon suivante:

En un 1^{er} prix de 300 fr.

En un 2^e prix de 200 fr.

Ces prix, comme il a été dit, seraient attribués seulement à des travaux rédigés suivant la conception variétiste, c'est-à-dire avec *dénomination*, tout au moins, des principales modifications des formes dites spécifiques.

Pourraient prendre part au concours des auteurs de toutes nationalités avec des imprimés (publiés dès 1930), ou des manuscrits rédigés de préférence en latin ou en français. Ceux rédigés en d'autres langues devraient être accompagnés d'un résumé en latin ou en français. Toute nouveauté publiée devra être précédée d'une diagnose rédigée en latin.

Ces indications ci-dessus sont des résolutions d'ordre général qui semblent devoir tout d'abord entrer en compte, mais, comme je l'ai déjà dit plus haut, rien de définitif n'est encore arrêté à l'heure actuelle. Il suffit de savoir, dès à présent, les clauses les plus importantes que je répète en les résumant:

En 1932, par l'intermédiaire du journal l'*Echange*, le prix « Thérèse » de 500 fr., fondé par le directeur de ce journal, sera distribué en deux sommes respectives de 300 et 200 fr. et décerné, en vue de récompenser deux manuscrits, ou imprimés publiés à partir de 1930, et exclusivement rédigés d'après la conception variétiste.

Quelques abonnés, malgré les avis répétés envoyés, sont encore en retard pour régler leur abonnement, mais nul ne devra être surpris, s'il n'est pas en règle, de ne plus recevoir le journal.

Le Directeur de l'*Echange* attire l'attention des amateurs de *Longicornes* sur l'intéressant ouvrage récemment édité par Paul Lechevalier et écrit par le Professeur F. Picard; il porte le N^o 20 [Coléoptères Cerambycidæ] de la Faune de France, de la collection de l'Office central du Faunistique.

BULLETIN DES ÉCHANGES

M. L. Puel, Albaron (Bouches-du-Rhône) échange (contre Coléoptères) et achète tous *Dyschirius* en tout nombre d'exemplaires, à l'exception du *D. globosus* de l'Europe.

M. Roger, Port d'Envaux (Charente-Inférieure) offre *Coléoptères Européens* et *Hémiptères Français*, désire *Coléoptères Français* et *Hémiptères Français*.

NOTES DE CHASSE

M. Sirguy a capturé: 1^o Dans les environs de Tours: *Cantharis lateralis* L., *Malachius viridis* F., *Agrilus caruleus* Rossi, *Hypophlaeus bicolor* Ol., *Anthicus hispidus* Rossi, *Phytæcia nigricornis* F.: — 2^o Dans les environs de Bourges: *Malthodes ruficollis* Latr., *Malachius elegans* Ol. et *viridis* F., *Anaspis 4-maculata* Gylh.; — 3^o Dans les environs de Lyon: *Malthodes dispar* v. *Noualhieri* Brg. et v. *obscuripes* Pic.

M. Jacquet a capturé à Thurens (Rhône): *Platyderus rufus* Duft.

M. Audras a capturé à Saint-Rambert (Ain) le très rare *Pterostichus nodicornis* Fairm.