L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (G. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodiens paléarctiques, Histriides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Evolytides, Phalacrides, Lathridiides.*

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Meloides, Ptilinide, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidos, Crioceridae, etc du globe. — Corambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques, Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e). — *Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. N. PIC. à DigoIn

(3 Mai 1930)

SOMMAIRE

Notes diverses, nouveautés, par M. Pic (suite).

Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

Notes brèves et réfléchies, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France: 7 francs. | Étranger: 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHEN 15

ANNONCES

La page	32 fr.	Le 1/4 de page	10 fr.
La 1/2 page	18 fr.	Le 1/8 de page	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.) les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 26 février 1930, 55 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Payement à l'avance. Frais de port en plus.

" Miscellanea Entomologica "

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages)	20 fr.
Edition réduite	10 fr.
Annonces seules	5 fr.

Direction et Rédaction: E. BARTHE
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN
(Haute-Garonne).

Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, nouveautés

PAR M. PIC

Malachius erythropterus Er. ♂. Ce sexe, peu connu, a la tête creusée postérieurement et élevée en gibbosité sur le milieu de l'épistome, en avant des antennes, cette gibbosité étant munie, sur son milieu, de longs poils clairs, les palpes sont bicolores ; le premier article des antennes épais, bicolore, le 2^e seul prolongé en dessous et presque sécuriforme, lui aussi est bicolore et pubescent, les 3^e et suivants allongés, presque cylindriques, noirs en dessus, jaunes en dessous, élytres simples au sommet. — J'en possède un exemplaire de Bagdad et plusieurs autres, recueillis, en 1903, sur les bords de l'Euphrate, par feu le Frère Augustalis.

Malachius coccineus v. nov. **Baudueri**. Elytris ad scutellum non viride notatis. Syrie (coll. Pic). — La forme type a le voisinage de l'écusson marqué de vert.

Malthinus axillaris v. nov. **Moricei**. Nitidus, late testaceus, capite postice thoraceque medio nigro-piceis, elytris in disco paulo brunneis. Palestine : Jéricho (Pic). — Variété caractérisée par la coloration plus claire. Dédié à la mémoire d'un de mes compagnons de voyage en Orient.

Malthinus verticalis n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, flavo-testaceus, capite postice rubro et nigro notato, thorace nigro et sinuate bivittato, elytris apice sulphureis, his postice paulo nigro notatis, sutura nigra, antennis nigris, ad basim testaceis ; capite lato, postice valde attenuato, collo longe et medio fortiter impresso ; thorace, sat transverso, antice valde attenuato, lateraliter ad medium paulo dilatato et subarcuato, ad basim fere recto ; elytris thorace paulo latioribus, substriatis et lineato-punctatis ; pedibus gracilibus, tibiis posticis non rectis, infra medium minute incisus, apice non dilatatis ; abdomine apice cupuliforme et inciso. Long. 5 mill. Sicile (coll. Pic). — Ressemble à *Raffrayi* Pic, mais tête différente ; prothorax plus robuste, bilinéolé de noir, etc.

Triplax Andreinii n. sp. Elongatus, aliquot paulo oblongus, nitidus, rufus, infra corpore aliquot paulo brunnescente, capite postice piceo aut brunnescente, elytris nigro piceis ; capite fortiter et sparse punctato ; antennis validis, articulo 3^e longiore, tribus ultimis valde dilatatis ; thorace parum breve, fortiter et sparse punctato, angulis anticis prominulis ; scutello rufo ; elytris diverse elongatis, fere instriatis et minute lineato-punctatis, callo humerale fere indistincto, ad basim paulo angulatis. Long. 3,5-4 mill. Italie : Basilicata (ex D^r Andreini, communiqué par Mancini et figurant aussi dans ma collection). — Voisin de *Marseuli* Bed., en diffère par la tête plus ou moins rousse, le prothorax moins robuste, à angles antérieurs nettement avancés, l'écusson roux, etc.

Je dois à M. Mancini la connaissance récente d'une forme nouvelle d'*Isomira* (*I. suturalis mihi*), provenant de Calabre, peut-être var. de *testacea* Seidl., à particulière coloration élytrale, les élytres étant d'un testacé roussâtre avec une bande suturale

noire et le rebord marginal foncé ; cette forme est oblongue, relativement large, à pubescence grise et ponctuation fine, dense sur le prothorax, l'aspect peu brillant, la coloration générale est noire avec les élytres bicolores, le labre et les membres testacés.

Notoxus mauritanicus v. nov. semiobliteratus. Elytris pallidis, ad scutellum piceo-maculatis et postice piceo-fasciatis. Algérie (coll. Pic). — Correspond à la var. *immaculatus* Pic, de *N. monoceros* L.

Notoxus brachycernus v. nov. obliteratus. Elytris pallidis, medio lateraliter in singulo piceo maculatis et postice piceo fasciatis. Algérie : Palestro (Pic). — Variété caractérisée par l'oblitération de la macule prescutellaire foncée existant chez la forme type.

Drymochares Truquii v. nov. rufipes. A typo pedibus rufis facile distinguendus. *Saint-Martin-Vésubie* (coll. Pic, ex Clermont), et plus anciennement de mes chasses à Venanson. — Correspond à la var. *rufipes* Pic, de *Saphanus piceus* Laich.

Opsilia flavescens v. n. estrelana. Elongatus et angustatus, niger, griseo pubescens. Espagne : Sierra da Estrela (coll. Pic). — Voisin de la var. *obscura* Bris., forme plus allongée avec les élytres plus longues.

Bruchus Schroderi n. sp. (1). Oblongo-elongatus, nitidus, sat dense et uniformiter, elytris exceptis, albo pubescens, rufo-testaceus, elytris apice brunneo-piceo maculatis ; femoribus posticis validis, muticis, pygidio longe prominulo, aliquot medio griseo lineato et diverse brunneo notato ; capite parum elongato, inter oculos medio callosio nitido munito ; antennis brevibus, apice paulo dilatatis ; thorace non transverso, obconico, antice valde attenuato, fortiter parum dense punctato ; scutello postice emarginato ; elytris thorace paulo latioribus, lateraliter subarcuatis, apice paulo attenuatis et subrotundatis, striatis, ad basim subtuberculatis, pro parte reducte albo lineatis et apice brunneo-piceo maculatis ; pedibus testaceis, femoribus posticis validis et muticis, tibiis brevibus, carinatis ; pygidio longe prominulo ; fortiter sat dense punctato, diverse pubescente, aliquot medio albo lineato, in medio et ad basim diverse, aliquot parum distincte, brunneo notato. Long. 3,5-4 mill. Allemagne : Erfurt. Importé avec des graines. — Paraît voisin de *B. rectabilis* Gyll., dont il diffère au moins par le revêtement différent du dessus et particulièrement par les élytres présentant une macule apicale foncée.

Je crois devoir séparer à titre de variété, et sous le nom de var. *importatus*, quelques exemplaires à pubescence des élytres uniforme, non disposée en mouchetures, les élytres sans macule apicale foncée (parfois seulement un peu obscurcies à l'extrémité près de la suture), et le pygidium à revêtement plus uniforme.

Cryptocephalus sinuatus v. nov. Mariei ♂. Oblongo-elongatus, subparallelus, nitidus, niger, epipleuris antice paulo rufescentibus, elytris in singulo ad medium reducte ochraceo-testaceo fasciatis, his diverse, pro parte irregulariter et disperse, pro parte sublineato, punctatis, articulis primis antennarum pro parte testaceis ; thorace sat convexo, lateraliter subarcuato et late marginato, diverse et sparse punctato (2) ;

(1) Cette espèce, avec sa variété, m'a été communiquée par mon estimable collègue Gebien ; elle est aussi représentée dans ma collection.

(2) La ponctuation est en partie allongée.

Photuris piceovittata n. sp. Elongatus, subnitidus, nigro-piceus, capite, thorace, illo medio piceo vittato, femoribus late tarsisque pro parte flavo-testaceis, elytris flavo-testaceis, in disco piceo vittatis, vitta antice ad scutellum curvata, apice paulo dilatata; thorace transverso, antice arcuato; elytris subparallelis, dense ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 10 mill. Bolivie. — Espèce très distincte par la présence d'une bande discale foncée sur chaque élytre.

Le **P. elongata** mihi, de la même origine, voisin du précédent par sa coloration, est plus allongé et plus parallèle, la tête est noire, les élytres ont une bande discale oblitérée en avant et une bande supplémentaire antérieure peu longue, rétrécie postérieurement, commune sur la suture, les 4, 5 segments de l'abdomen sont blancs.

P. flavicollis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, niger, thorace femoribusque antice pro parte flavis, infra corpore brunnescente, segmentibus 4, 5 abdominis albis; thorace parum transverso, antice arcuato; elytris thorace paulo latioribus, lateraliter subarcuatis, dense ruguloso-punctatis, in disco antice multi costulatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *blatoides* Cast., en diffère par le prothorax entièrement flave, les élytres presque mates et plus fortement sculptées.

B. Biolleyi n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, niger, thorace lateraliter et antice flavo, in disco externe rubro notato, elytris externe et late flavo marginatis; segmentibus 4, 5 abdominis pro parte rubris, aut flavis. Long. 9 mill. Costa-Rica. — Ressemble à *lucidicollis* Gorb., mais un peu plus étroit, bande noire du prothorax plus nette, élytres à bordure claire rétrécie aux extrémités, n'atteignant pas l'apex.

Bicellonycha brunneonotata n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, niger, pro parte brunneo-piceus, thorace, illo postice brunneo binotato, scutello apice elytrisque testaceis, his interne longitudinaliter piceo univittatis, vitta postice oblitérata; abdomine apice late albo. Long. 15 mill. Colombie. — A placer près de *melanura* Mots., très distinct par la présence, sur chaque élytre, d'une bande foncée rapprochée de la suture.

B. multilineata n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, niger, scutello testaceo, thorace elytrisque testaceis, et multi nigro vittatis. Long. 16 mill. Amérique M^l. — Voisin du précédent par sa forme, mais coloration tout autre et d'ailleurs très particulière, soit par le milieu du prothorax alterné de bandes noires (4) et claires (3) tandis que le pourtour est largement testacé, soit par les élytres à bandes alternées diverses noires et testacées avec la suture testacée, le bord externe et l'apex noirs.

Discodon atriceps n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite, antennis tarsisque nigris; antennis sat gracilibus; thorace breve et lato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, sinuatis, sat elongatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, indistincte costulatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *Baeri* Pic, en diffère par la coloration entièrement foncée de la tête et des antennes, la sculpture moins fine des élytres.

Le **D. Reitteri** mihi, du Brésil, noir, avec le prothorax, l'écusson, les élytres testacés, la base des cuisses rousse, est très voisin du précédent, il est plus allongé avec les pattes largement foncées et le dessous du corps noir.

D. hatzenae n. sp. Sat robustus, nitidissimus, testaceus, antennis femoribusque apice nigris; antennis gracilibus; thorace breve et lato; elytris thorace non latioribus;

elongatis, minute pro parte ruguloso-punctatis. Long. 8 mill. Guyane Française. — Plus robuste que le précédent. avec les cuisses annelées de foncé, la tête claire.

D. basicorne n. sp. Elongatus, parallelus, nitidus, testaceus, antennis nigris, ad basim testaceo notatis; antennis gracilibus; thorace parum breve, sat lato, lateraliter sinuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, pro parte granulosis, incostatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *subannulicorne* Pic, plus allongé avec le prothorax moins large.

D. maroninum n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite, aliquot mandibulis exceptis, antennis pro parte elytrisque apice breve nigris; oculis valde ♀, aut maxime ♂, prominulis; antennis gracilibus, nigris, apice testaceis; thorace parum breve, lateraliter distincte, inciso ♂, aut latiore, et sinuato ♀; elytris thorace non latioribus, elongatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 7-8 mill. Guyane Française. — A placer près de *curteapicale* Pic, mais élytres moins longues, tarses plus clairs et antennes bicolorées.

D. friburgonum n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, thorace, illo postice medio nigro-piceo maculato elytrisque testaceis, his ad suturam longe, antice latiore et infra humeros reducte nigro lineatis, apice nigro maculatis. Long. 9 mill. Brésil. — Espèce très distincte par ses dessins élytraux. A placer près de *nigrosuturalé* Pic (1).

D. immaculatum n. sp. Elongatus, nitidus, parallelus, antennis, articulis ultimis exceptis, femoribus apice, tibiis pro parte, tarsis abdomineque nigris; antennis brevibus et gracilibus; thorace sat breve et lato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, elongatis, pro parte rugulosis, incostatis. Long. 9 mill. Pérou. — Voisin de *espirtense* Pic, mais pattes de coloration particulière, élytres non marquées de foncé au sommet.

D. albonotatum v. nov. testaceipes. Subparallelus, niger, thorace lateraliter testaceo, elytris in disco vage flavo notatis, pedibus testaceis. Brésil (ex Hicker). Caractérisée par la coloration des pattes.

Silidius latior n. sp. ♀. Oblongus, robustus, nitidus, griseo pubescens, rufo testaceus, membris (femoribus ad basim rufis), elytris apice late et pectore pro parte nigris; capite sat minuto; antennis parum brevibus, sat crassis; thorace valde transverso, antice arcuato, lateraliter fere recto, non inciso; elytris latis, parum elongatis, in disco subcostulatis, minute et dense punctatis; pedibus sat validis. Long. 11 mill. Congo. — Voisin de *africanus* Pic et s'en distinguant, à première vue, par la forme plus robuste du prothorax et cet organe non incisé vers les angles postérieurs.

S. circumcinctus v. nov. reductus. Thorace rubro, elytris testaceis, ad basim nigro notatis. Congo.

S. nigriceps n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, mandibulis thoraceque rufo-testaceis, elytris pallidioribus; capite cum oculos latiore, minute punctato, antennis sat gracilioribus, elongatis; thorace obcordato, antice arcuato, lateraliter postice attenuato et minute biinciso, in disco medio postice impresso et sulcato;

(1) Mes anciens *Telephorus* de l'Amérique Méridionale doivent presque tous rentrer dans le genre *Discodon* Gorb.

elytris thorace latioribus, elongatis, subparallelis, minute et dense punctatis; pedibus sat gracilibus. Long. 8 mill. Abyssinie. — Voisin de *Murtulai* Pic, prothorax différent et immaculé.

S. pallidipennis n. sp. ♀ Elongatus, parum nitidus, pallido-testaceus, capite postice et thorace rufis, illis nigro notatis, antennis, femoribus apice, tibiis tarsique nigris; capite thorace non latiore, antice flavo, postice rufo et in vertice nigro maculato; antennis gracilibus, sat brevibus; thorace parum breve, antice arcuato, lateraliter sinuato, in disco medio late nigro lineato, postice late impresso; elytris thorace latioribus, elongatis, lateraliter subsinuatis, minute et dense punctatis; pedibus gracilibus. Long. 12 mill. Congo. — Voisin de *Elisabethæ* Pic, caractérisé par la coloration concolore pâle des élytres.

Apalochrus inapicalis n. sp. ♂. Oblongus, viridi-metallicus, elytris paulo cyaneis, lateraliter medio testaceo notatis; capite antice luteo et elevato, antennis rufis, apice piceis, pedibus rufis, femoribus posticis pro parte metallicis, tarsis apice piceis, abdomine testaceo, apice et pygidio metallicis; capite inter oculos excavato; thorace breve et lato, lateraliter impresso, distincte sed sparse punctato; elytris parum elongatis, postice paulo dilatatis, dense et minute punctatis; tibiis intermédiis extus triangulariter dilatatis, intus longe dentatis. Long. 7 mill. Cameroun. — A placer près de *uninotatus* Pic.

A. longior v. nov. *reductenotatus*. Plus robuste que forme type avec les élytres foncées à l'apex et seulement marquées, sur la suture, très brièvement de rouge. Congo.

A. longior v. nov. *semifasciatus*. Elytres largement claires à l'apex et à fascie médiane claire se rétrécissant sur la suture. Congo (in Musée du Congo, à Tervueren; aussi coll. Pic).

A. jokoensis n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, viridi-metallicus, pro parte cyaneus, membris abdomineque pro parte testaceis; capite sat dense et minute-punctato, subnitido; antennis parum crassis et elongatis, nigris ad basim late testaceis; thorace parum breve et lato, postice strangulato, minute et paulo punctato; elytris thorace paulo latioribus, ad apicem dilatatis, ad humeros et ad scutellum paulo impressis, sat minute et dense punctatis; pedibus anticis testaceis, femoribus pro parte nigris, tibiis parum crassis, subsinuatis, coxis dentatis, pedibus intermédiis metallicis, femoribus ad basim testaceis, tibiis paulo incrassatis et externe postice late incisés, pedibus posticis nigris metallicis. Long. 4, 5 mill. Cameroun: Jokó. — Voisin de *sinuatipes* Pic, mais les élytres sont un peu moins longues, les pattes antérieures sont plus claires avec les tibias un peu plus robustes ayant une échancrure large et prononcée sur la tranche externe des intermédiaires.

Macrolygistopterus Grandjeani n. sp. Angustatus, subparallelus, parum nitidus, nigro-cæruleus, thorace lateraliter aurantifaco; rostro breve; thorace parum transverso, antice paulo attenuato, medio sulcato; elytris subparallelis, in singulo distincte regulariter 4-costatis, dense ruguloso-punctatis. Long. 15 mill. Mexique. — Très voisin de *cæruleus* Gorb., en diffère par le prothorax plus étroit avec les côtes des élytres plus régulières.

M. testaceirostris n. sp. Elongatus, parum angustatus, subnitidus, niger, rostro, thorace lateraliter late elytris que aurantiacis, his apices sat late nigro-cyaneis, femoribus

ad basim paulo rufo-notatis; rostro elongato; thorace parum transverso, antice paulo attenuato, medio postice sulcato; elytris antice paulo latioribus, fortiter et regulariter 4-costatis, minute et dense punctatis. Long. 17, 18 mill. Brésil. — Voisin de *4-costatus* Buq., en diffère, à première vue, par le rostre testacé.

M. Germaini n. sp. Parum elongatus, postice mediocre dilatatus, subnitidus, niger, thorace lateraliter late et antice anguste aurantiaco, elytris nigro-subcyaneis, ad basim atrantiacis, sutura et macula reducta prescutellaris nigro-subcyaneis; rostro sat elongato; thorace subtransverso, antice paulo attenuato, medio postice longe sulcato; elytris regulariter sed minute 4-costatis, minute et dense ruguloso-punctatis. Long. 14 mill. Brésil. — A placer près de *bilineatus* Pic, en diffère par la bande unique et large du prothorax et la coloration noire bien plus étendue sur les élytres.

Le **M. subparallelus** mihi, du Paraguay, est plus parallèle que le précédent avec les élytres marquées de fortes côtes, orangées sur plus de leur moitié antérieure et la suture non foncée, le prothorax est plus inégal en dessus, inégalement impressionné au milieu et les impressions sont sillonnées dans le fond.

M. succinctus v. *scutellaris* (Brg.) Elytres ayant, en outre de la partie postérieure foncée, une portion prescutellaire noire sur leur base qui est largement rouge. Equateur.

Falsocænia breveapicalis n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, subopacus, niger, thorace lateraliter et elytris aurantiacis, his ad scutellum reducte nigro vittatis, et apice reducte nigro marginatis; antennis deplanatis, articulis intermediis paulo angulatis; thorace sat breve et parum lato, antice attenuato, angulis posticis prominulis; elytris tricostatis, intervallis diverse plicatis. Long. 9 mill. Costa-Rica. — Ressemble à *C. decipiens* Gorb., mais côtes plus élevées antérieurement et élytres marginées de noir à l'apex.

Calleros (1) subfasciatus n. sp. Elongatus et angustatus, subopacus, niger, elytris postmedium ochraceo fasciatis, fascia externe dilatata; antennis parum latis, apice attenuatis; thorace sat breve, antice subarcuato, marginato, postice medio longe sulcato; elytris elongatis, postice paulo dilatatis, multi et fere æqualiter costatis. Long. 6 mill. Pérou. — Voisin de *bimaculatus* Pic, en diffère par les élytres plus longues, fasciées de clair.

C. postseparatus n. sp. Elongatus et angustatus, parum nitidus, niger, elytris apice in singulo luteo bimaculatis; antennis sat gracilibus; thorace subquadrato, medio longe sulcato; elytris elongatis, subparallelis, multi et fere æqualiter costatis. Long. 7-8 mill. Pérou. — Très voisin de *peruvianus* Pic, s'en distingue, à première vue, par la macule apicale claire divisée en deux par un trait noir longitudinal.

C. elongatus n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, antennis apice testaceis, elytris luteis, apice nigro notatis, ad suturam antice nigro vittatis, vitta postice attenuata; antennis sat gracilibus, elongatis; thorace sat breve, parum lato; elytris longissimis, minute et multi costatis costa humeralis antice valde distincta. Long. 5,5 mill. Bolivie. — Espèce très distincte par sa forme élytrale allongée plus que de coutume et sa coloration.

(1) Je pense que toutes les espèces américaines décrites autrefois comme *Plateros* doivent rentrer dans le genre *Calleros* Gorb.

tibiis anticis depressis, latis, ad apicem extus subangulatis, tarsis validis. Long. près de 5 mill. Basses-Alpes : Larche, des chasses de M. Pierre Marié, et communiqué par lui.

Au premier abord, par la coloration complètement noire de l'avant-corps et de l'écusson de cet insecte, on serait tenté de le considérer comme une espèce propre, mais il m'apparaît plus juste de le regarder comme une simple variété (se rapprochant de la var. *atroscutellaris* Pic), de *C. sinuatus* Har. distincte, à première vue, par la tête toute noire, la coloration foncée plus étendue sur les élytres, celles-ci étant dépourvues de bande médiane claire complète. Il se pourrait qu'il y ait aussi une différence dans la ponctuation élytrale, celle-ci se montrant moins dispersée et en dessus en partie formée de rangées de points rapprochées 2 à 2.

(A suivre.)

M. PIC.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Physciolagria n. gen. Corpus elongatus ; capite breve, oculis validis, valde convexis, integris, pilosis ; articulo ultimo palparum elongato, apice truncato ; antennis sat brevibus, valde dilatatis, articulo 2° breve, 3° triangulare, apice latiore, 4°-10° brevibus et valde transversis, ultimo elongato, sat lato, et depresso, apice subtruncato ; thorace lateraliter immarginato, postice infra excavato, supra postice marginato et impresso, angulis anticis nullis, posticis subrectis ; elytris thorace latioribus, elongatis, epipleuris arctis, postice indistinctis ; pedibus sat gracilibus, tarsis elongatis, articulo penultimo lobato, unguibus subdentatis ; coxis anticis et intermediis conicis, approximatis.

Ce curieux genre (établi pour l'espèce qui suit) ressemble quelque peu à certains *Physcius* Chp., mais me semble devoir rentrer plutôt dans les *Lagriidæ* que parmi les *Lacconotinæ*, en étant surtout caractérisé par la structure antennaire, les grands yeux apparaissant entiers, les épipleures très étroites, la structure tarsale. Le prothorax particulier n'a pas de rebord latéral tranchant, mais les côtés postérieurs de cet organe se montrent sous forme d'arête très émoussée, cet organe est nettement rebordé et diversement impressionné sur la base.

Physciolagria liturata n. sp. Elongatus, nitidus, breve sat dense griseo aut luteo pubescens, niger, capite pro parte rufescente, thorace postice, scutello elytrisque luteis, his ad suturam apice breve nigro lineatis ; capite cum oculos thorace paulo latiore, nigro, postice medio rufescente, parum fortiter et sparse punctato, oculis sat approximatis, antennis brevibus, opacis, pilosis ; thorace breve et parum transverso, antice paulo attenuato, parum fortiter et sparse punctato, supra postice inæquale triimpresso ; elytris thorace latioribus, elongatis, postice paulo latioribus, apice attenuatis, minute et dense punctatis, pro parte et parum distincte sub-costulatis. Long. 8 mill. Uganda : Nil Blanc (Hancock, in British Museum) (1).

(1) L'unique exemplaire communiqué étant malheureusement collé, j'ai dû le décoller pour pouvoir examiner le dessous du corps, qui est resté un peu englué de colle, d'où il est résulté un manque de netteté visuelle pour l'examen des pattes postérieures.

Callispa luzonica n. sp. Oblongo-subelongatus, nitidus, testaceus, elytris apice sat late violaceis, antennis nigris ; thorace breve et lato, fortiter et inæquale punctato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis subparallelis, apice paulo attenuatis, substriatis et lineato-punctatis. Long. 4 mill. Luzon (coll. Pic). — Voisin de *cribrata* Gestro (ex description).

Callispa puellaris n. sp. Oblongo-subelongatus, nitidus, testaceus, antennis nigris ; thorace breve et lato, sparse sat fortiter punctato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, subparallelis, apice paulo attenuatis, substriatis et lineato-punctatis. Long. 4 mill. Philippines (coll. Pic). Très voisin du précédent, en diffère, à première vue, par les élytres non marquées de foncé à leur extrémité.

Callispa bicoloripes n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, elytris paulo cyaneis ; thorace femoribusque pro parte rufis ; thorace breve et lato, antice attenuato, sparse et inæquale punctato ; elytris thorace parum distincte latioribus, elongatis, subparallelis, apice paulo attenuatis, substriatis, lineato-punctatis. Long. 5 mill. Congo (coll. Pic). — A placer près de *africana* Baly.

(A suivre.)

M. Pic.

Notes brèves et réfléchies

Je suis parfois accusé de décrire trop, et cependant il arrive que d'autres entomologistes, spécialistes après moi, publient plus encore que moi-même ; alors, que faut-il penser en définitive sur la valeur réelle du jugement exprimé ? Ainsi, j'ai décrit quelques *Formicomus* Laf., des Iles Philippines, une demi-douzaine environ, mais depuis quelques années, Krekich-Strassoldo (1) en a fait connaître plus de vingt, de cette même région ; cet auteur a notamment multiplié les espèces des groupes du *braminus* Laf. et de l'*obscurus* Pic, en employant des différences tirées des organes génitaux masculins. Ce système déterminatif rendu exclusif peut, selon moi, conduire à l'exagération tout aussi bien que les anciennes distinctions basées sur l'un ou l'autre organe du corps. Il ne faut rendre aucun caractère exclusif ou primordial, mais se servir de tout ce qui peut contribuer à la distinction nette, ou facile, des insectes prétendus différents.

Et je conclus : Deux insectes ♂ ayant des forceps un peu modifiés dans leur contour, peuvent bien représenter une unité spécifique. D'autre part, si deux insectes ♂, bien qu'ayant des forceps analogues, offrent des différences perceptibles venant d'autres organes, il convient de ne pas les réunir et de les distinguer entre eux (sinon au titre spécifique, au moins comme variété ou *aberration*... terme cher à certains auteurs).

Par exemple, Krekich-Strassoldo a réuni (*Phil. Journ. Sc.* 40, 1929, p. 480), *Anthicus manillanus* Pic, des Philippines, avec notre espèce paléarctique *A. crinitus* Laf., parce que, selon lui, ils ont les mêmes organes de copulation.

Laissant à part les organes génitaux, je constate que les types de *A. manillanus* Pic, comparés à nos *A. crinitus* Laf., s'en distinguent par le prothorax plus robuste et surtout par la tête plus claire, sans aucune teinte noirâtre, donc pas plus foncée que celle du prothorax.

M. Pic.

(1) Cet article est rédigé depuis un certain temps ; récemment j'ai appris la mort de cet auteur à la mémoire duquel je m'empresse d'adresser un hommage ému tout particulier.

A PROPOS DU " PRIX THÉRÈSE "

Consulter les renseignements précédemment donnés au sujet de la fondation d'un prix variétiste et qui figurent sur la couverture (3^e page) des N^{os} 435, 437, 438. Je résume ce qui a été dit. A la suite d'une initiative privée, il a été projeté d'attribuer, en 1932, des prix à des ouvrages ou articles publiés dans le cours des deux années précédentes (les articles « in litteris » peuvent également concourir), rédigés suivant l'idée variétiste, ces prix étant d'une valeur de 300, 200 et 100 francs. Un de ces prix est dû à la générosité d'un de nos plus sympathiques collègues de l'Amérique du Sud, qui désire garder l'anonymat. Les mémoires du concours doivent être rédigés, je le répète, suivant l'idée variétiste, autrement dit les variétés ou sous-variétés seront étudiées comme il convient, puis désignées par des noms. Je répète, en outre, ou ajoute, les précisions qui suivent :

Pourront concourir pour l'un ou l'autre des trois prix, soit les imprimés publiés en 1930 ou 1931, soit de simples manuscrits (ceux-ci écrits en latin, français, anglais ou allemand). Les nouveautés devront être rédigées en latin, ou leur description, tout au moins, être précédée d'une diagnose latine. Une étude sur une seule espèce variable, — mais alors détaillée au point de vue des variétés, sans exagération bien entendu, — qui devront être présentées chacune avec un nom particulier, pourra être admise au concours. Consulter, à titre d'indication, mes études, publiées en « hors-texte » dans « L'Echange », sous le titre de : « Etude détaillée de divers insectes » et traitant diverses espèces au point de vue variétiste. Mon étude détaillée, parue il y a quelques années (voir N^o 391 et suivants de 1919; N^o 403 de 1921), et interrompue pour faire place à d'autres travaux, sera reprise, je l'espère, prochainement.

Les imprimés, ou manuscrits, destinés au Concours de 1932, devront être envoyés au Directeur de « L'Echange », avant le 1^{er} janvier 1932 (dernier délai). Le jury chargé de l'attribution du « Prix Thérèse », sera composé de la direction et du comité de rédaction de « L'Echange », auxquels pourront être adjoints des entomologistes aux idées larges, qui seront ultérieurement désignés et qui voudront bien, sans crainte de compromettre leur réputation, accepter ces toutes gratuites fonctions. En désirant distribuer, par la voie du journal « L'Echange », et sur avis d'entomologistes serviables et de bonne volonté, quelques récompenses modestes et momentanées pour des travaux variétistes, je ne pense pas avoir mérité des blâmes sérieux. Si j'encours les foudres de ceux qui comprennent autrement que moi l'esprit dit scientifique, je n'en serai pas émotionné outre mesure, car, plus que jamais, la Philosophie me sert et me guide.

M. Pic.

Annonces et Avis divers

Ont payé leur abonnement depuis février dernier, MM. : Berjstedt, Borchmann, Clermont, Collart, Dalibert, Falcoz, Hardy, Dr Heyrowsky, Dr W. Horn, Lambertie, Maguin, Méquignon, de Peyerimhoff, Puel, Dr Riel, Dr Royer, Dr Sicard, Sirguy, Steerkert, Théry, de Touzalin, Roger.

Certains abonnés ont l'amabilité d'augmenter spontanément le prix de l'abonnement. La Direction les en remercie cordialement.

M. Soumakov propose de muter en *Folovi kopalensis* la forme qu'il a présentée (N^o 435 de « L'Echange »), sous le nom de *Frolovi Schapinskii*, ce nom étant déjà donné. (Rev. Russe Ent., XXI, 1927, p. 26).

M. J. Dayrem, Brantôme (Dordogne), offre Longicornes kabyles, Coléoptères nocturnes de Laghouat, etc. Demande uniquement Cerambycides. Envoyer oblata. Sauf avec anciens collègues, se réserve le contre-envoi.

M. P. Sirguy, 28, rue James-Cane, à Tours, offre environ 175 Curculionides non nommés du Midi de la France et d'Algérie. Accepterait en échange Coléoptères de France. Offre aussi 2 exemplaires de *Alaocyba Therryi*.