

# L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR J. QUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (O. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodiens paléarctiques, Histiérides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Latridiides.*

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridæ, Plinidæ, Nanophyes, Anthicidæ, Pedilidæ, Crisoceridæ, etc du globe. — Cerambycidés de la Chine, du Japon, etc. Cryptocéphalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>)  
*Coléoptères de France (Curculionidés exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces.

A M. M. PIC, à Digoïn

(9 Février 1931)

SOMMAIRE

Notes diverses, nouveautés, par M. Pic (suite).

Notes sur les « Hyperini », par M. Pic.

Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 7 francs. | Étranger : 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN 15

# ANNONCES

La page . . . . .	32 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	10 fr.
La 1 <sup>re</sup> page . . . . .	18 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

*En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc. les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

Chez l'auteur, Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire).

1° *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en 10 cahiers ou 19 fascicules.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent, à la date du 20 juin 1930, 56 fascicules. Se vend par fascicules séparés (à prix divers) ou complet.

Paiement à l'avance. Frais de port en plus.

---

## "Miscellanea Entomologica"

*Revue entomologique internationale*

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages) . . . . .	20 fr.
Edition réduite . . . . .	10 fr.
Annonces seules . . . . .	5 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

## Pour les déterminations

*Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.*

*Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, nouveautés

PAR M. PIC

Un « lapsus calami » a fait substituer dans le numéro 442, p. 13 de l'*Echange*, le nom générique (inexact) *Gastrallus* à celui (exact) de *Episernus* ; on est prié de vouloir bien prendre bonne note de cette correction. Lire aussi (p. 16) *Achrostus*, au lieu de *Ochrostus*.

*Graptodytes lepidus* ab. Oberthuri Guignot (*Bull. Soc. Ent. Fr.* 1930, p. 300 et 301) est synonyme de v. *Fauconneti* Pic (*l'Echange*, n° 442, 1930, p. 14), ce dernier ayant été publié environ deux mois avant.

*Bruchus dispar* v. nov. *atricornis*. Oblongus, niger, supra griseo pubescens, pro parte nigro notatus, pygidio et infra corpore fere uniformiter griseo pubescentibus ; antennis sat brevibus, nigris ; thorace obconico ; pedibus rufis, femoribus ad basim, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, femoribus posticis inermibus. Long. 4 mill. environ. Angleterre : Manchester (British Museum et coll. Pic). — Cette petite espèce a le prothorax maculé de foncé sur son milieu et en avant, les élytres sont ornées antérieurement de petites macules noires, dont une humérale et sur les côtés vers le milieu, ainsi que près du sommet, largement marqués de noir. Diffère, à première vue, de *B. dispar* Germ. par ses antennes entièrement foncées.

*Dorcadion Destinoi* var. nov. *subelongatum*. ♀ Subelongatus, griseo-fulvo pubescens, elytris distincte griseo vittatis, intus interrupte griseo vittatis. — Forme élytrale un peu allongée, à revêtement gris fauve avec des bandes grises bien distinctes, la discale étant flanquée de petits traits clairs indiquant une bande supplémentaire incomplète. Akbès (coll. Pic). — Diffère de la ♀ représentant la forme typique par les élytres un peu plus longues, leur bande discale étant étroite et comme décomposée.

*D. aleppense* Kr. v. nov. *tabense* ♂. Supra fulvo pubescens et albo vittatis, in elytris vitta lata discoidalis alba, membris rufis. Syrie : Ain-Tab. (coll. Pic). — Variété caractérisée par la bande discale uniforme et large des élytres et les antennes rousses. — La variété *latebivittatum* Pic. voisine, a une forme moins allongée et les antennes en majeure partie foncées.

*Pterolophia multinotata* n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, elytris diverse et multi griseo maculatis, postice griseo bifasciatis, apice oblique truncatis, ad basim breve nigro cristatis, in disco reducte bicostatis, costis antice et apice oblitteratis.

Allongé, un peu rétréci en arrière, peu brillant, noir, pubescent de gris, élytres ornées de nombreuses macules grises et postérieurement de 2 fascies grises et un peu fauves. Tête fortement et densément ponctuée en arrière avec un sillon sur le vertex, labre et épistome testacés ; antennes un peu moins longues que le corps, grêles, en partie annelées de gris ; prothorax subcarré, un peu et courtement rétréci aux extrémités, transversalement impressionné près du bord antérieur

et subsillonné sur le disque, à punctuation forte et rapprochée; écusson noir, bordé de jaune; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longues, subparallèles, atténuées postérieurement, obliquement tronquées à l'apex, ornées chacune de deux côtes discales raccourcies, marquées avant et après le milieu surtout, avec une petite arête basale noire peu hispide, à punctuation forte et rapprochée, multimaculées de gris avec 2 fascies postérieures grises, celle antéapicale étant plus courte; pattes un peu robustes, pileuses. Long. 8 mill. Corée (coll. Jurecek).

Peut se placer près de *angusta* Bates, dont il se distingue, à première vue, par les élytres ornées de très nombreuses macules et de deux fascies pubescentes.

Mon correspondant M. Thierriat (à qui l'on doit la découverte ancienne du *Platytomus albinus* v. *Thierrati* Vit (1), a capturé de nouveau, dans la Côte-d'Or, *Donacia Malinovskyi* Ahr. déjà cité par Rouget, et a récolté avec la forme typique (à dessus du corps métallique), la var. *arundinis* Ahr. (non citée), différant du type par le prothorax et les élytres fauves; cette variété mime, par sa coloration, *D. jennica* Payk., espèce exclusivement boréale selon l'auteur russe Jacobson.

*Phytœcia* (*Neomusaria*) *alepensis* n. sp. *Elongatus*, *niger*, *griseo-pubescentis*, *capite* *pro* *major* *parte*, *thorace* *medio* *et* *lateraliter* *scutelloque* *dense* *luteo* *pubescentibus*, *pedibus* *pro* *parte*, *pygidio* *et* *abdomine* *apice* *testaceis*; *elytris* *uniformiter* *griseo* *pubescentibus*. Long. 10 mill. Syrie: Alep (coll. Pic). — Voisin de *Merkli* Gglb., par le revêtement des élytres, en diffère, à première vue, par les côtés du prothorax nettement et densément pubescents, l'extrémité de l'abdomen complètement testacée.

*Timarcha goettingensis* (*coriaria*) v. *nov. semirufa*. *Nigro-cærulescens*, *elytris* *rufis*. ? Alsace (Leprieur, in coll. Pic). Variété distincte, à première vue, par la coloration bicolore du dessus du corps, foncée, avec les élytres rousses.

(A suivre.)

M. PIC.

## Notes sur les « Hyperini »<sup>(2)</sup>

C'est avec grand intérêt que, récemment, j'ai pris connaissance de la partie des Curculionides gallo-rhénans d'Hustache traitant les *Hyperini* (*Ann. Soc. Ent. Fr.*, XCVIII, 1929, p. 24 ou 607 et suivantes, car, depuis longtemps, je m'intéresse à ce groupe difficile qui comprend, pour notre faune, un certain nombre d'espèces plus ou moins rares et dont certaines même ne sont connues que par quelques exemplaires isolés dans les collections. Bien qu'ayant voyagé beaucoup autrefois, je n'ai recueilli que quelques spécimens d'espèces vraiment rares, mais, avec les collections Fauconnet, D' Jacquet, Leprieur, Tournier, Viturat et diverses acquisitions, entre autres beaucoup d'exemplaires intéressants de la collection Grenier (une des plus riches de l'époque), j'ai réuni pas mal de matériaux sur les *Hyperini*, et je possède la presque totalité des espèces françaises.

Quelques captures particulièrement intéressantes sont à ajouter<sup>(2)</sup> à celles mention-

(1) *L'Echange* 1895, p. 110.

(2) Article rédigé depuis plus d'un an est resté *in litteris*.

**Calleros Grandjeani** n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, thorace testaceo, medio postice nigro maculato; antennis latis, apice attenuatis; thorace breve et lato, medio longe sulcato, postice sinuato; elytris elongatis subparallelis, intervallis alternis distincte elevatioribus. Long. 8 mill. Brésil (ex coll. Grandjean). — Voisin de *varii costatus* Bourg., paraît différer de ce dernier par l'aspect un peu brillant, la coloration plus foncée, le prothorax d'une autre forme.

Le **C. guyanensis** mihi, de la Guyane Française, de coloration analogue au précédent, s'en distingue par le prothorax encore plus court et plus large, plus courtement sillonné, les élytres moins longues et moins parallèles.

**C. blumeneausus** n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace, illo medio late nigro-piceo, humerisque reducte testaceis; antennis sat latis, apice attenuatis; thorace sat breve et lato, antice subarcuato, postice medio late et breve sulcato; elytris parum elongatis, subparallelis, multi et equaliter costulatis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *latior* Pic, en diffère par le sillon plus court du prothorax, la macule humérale réduite et les côtes plus régulières des élytres.

Le **C. minimus** mihi, du Pérou, est petit, long de 4 mill., moins foncé, le prothorax est largement clair, maculé de foncé au milieu, les cuisses sont en partie claires et la macule humérale est très petite.

**C. terminalicornis** n. sp. Elongatus, parallelus, fere opacus, niger, antennis apice, thorace lateraliter humerisque testaceis; antennis parum latis et elongatis, apice attenuatis; thorace sat breve et lato, antice subarcuato; elytris elongatis, subparallelis, multi sat regulariter costatis. Long. 6-7 mill. Pérou. — Distinct, à première vue, des deux précédents par la forme plus étroite et les antennes ayant leurs 3 derniers articles testacés.

**C. Lajoyei** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter late et elytris antice et externe longe testaceis; antennis parum crassis, apice attenuatis; thorace parum breve, sat lato, antice subsinuato; elytris elongatis, subparallelis, intervallis alternis pro parte elevatioribus. Long. 7 mill. Vénézuëla. — Peut se placer près de *Dalmasi* Brg.

**C. Le Moulti** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, thorace testaceo, medio piceo-brunneo notato, humeris testaceo notatis, infra corpore pro parte femoribusque ad basim rufescentibus aut testaceis; antennis parum validis; thorace parum breve, sat lato, antice subarcuato, angulis posticis valde prominulis, medio paulo sulcato; elytris sat latis et parum elongatis, apice paulo dehiscentibus, diverse costatis, costis alternis elevatioribus. Guyane Française (ex Le Moult). — Voisin de *goyasensis* Pic, plus robuste avec le prothorax marqué de foncé.

Le **C. Bang-Haasi** mihi, du Brésil, est plus allongé, il a le prothorax moins transversal avec les angles postérieurs peu prolongés, les élytres, moins brillantes, ont une large bande humérale testacée, amincie postérieurement.

**Lycus basicornis** n. sp. ♂. Obcordatus, deplanatus, ochraceus, antennis pro parte, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris apice reducte nigro notatis. Long. 22 mill. Afrique Orientale: Usegua. — Très voisin du *Duvivieri* Brg., même forme des élytres, s'en distingue par la coloration claire du dessous du corps et d'une

partie des membres, le prothorax concolore, les élytres sans macule préscutellaire foncée.

**Falsocænia irregularis** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter, articulo 1° antennarum ad basim et ultimo testaceis, elytris nigris, ad humeros aurantiaco vittatis et ante apicem late aurantiaco fasciatis; antennis depressis; thorace parum lato, antice subarcuato, medio carinato, angulis posticis prominulis; elytris ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis, tricotatis, intervallis plus minusve late et irregulariter fenestratis, paulo plicatis. Long. 8 mill. Pérou. — Très voisin de *apicicornis* Pic, s'en distingue, à première vue, par la fascie postérieure claire des élytres bien plus large et plus rapprochée de l'extrémité.

On peut rapporter à cette espèce, comme variété, sous le nom de var. **Germaini** des exemplaires recueillis en Bolivie par Germain (collection Kraatz), in Musée Dahlem) ayant les élytres orangées avec une macule apicale noire et présentant une bande antérieure suturale (étendue sur le 1<sup>er</sup>, parfois sur le 2<sup>e</sup> intervalle) et jointe à une grande macule médiane interne également noire, celle-ci n'atteignant pas le bord externe des élytres.

**F. diversecostata** n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus, niger, thorace lateraliter coxisque testaceis, elytris nigris, ad humeros testaceo vittatis et postmedium sinuate testaceofasciatis, costa humeralis usque ad fasciam testacea; antennis fractis; thorace parum lato, antice subarcuato, medio carinato, carina postice minute sulcata, angulis posticis prominulis; elytris ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis, tricotatis, intervallis parum latis, sat regulariter fenestratis et multi plicatis. Long. 8 mill. Bolivie: Yungas (Germain, in Musée Dahlem). — Ressemble à *irregularis* Pic, s'en distingue par les plis des intervalles plus réguliers et moins écartés, la bande claire des élytres plus étroite et la côte humérale complètement claire jusqu'à la fascie.

**Cyrtopteron aurantiacum** n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, thorace circa elytrisque aurantiacis, his ad medium late nigro notatis, sutura antice nigra, articulis 2 ultimis antennarum flavis; thorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis valde prominulis, medio carinato, carina postice sulcata; elytris elongatis, ad medium paulo latioribus, apice attenuatis, 4-costatis, intervallis plus minusve late et irregulariter fenestratis aut plicatis. Long. 8 mill. Bolivie (coll. Pic). — Cette espèce mime par sa coloration *Falsocænia longehumerale* Pic, mais la structure des élytres ayant 4 côtes au lieu de 3, la distingue à première vue.

**C. bicoloricorne** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace circa elytrisque aurantiacis, his ad medium et apice nigro maculatis, sutura antice nigra, articulo ultimo antennarum flavo; capite parum prominulo, sine rostro; thorace parum elongato, antice subsinuato, angulis posticis prominulis, medio carinato, carina postice paulo sulcata; elytris elongatis, ad medium paulo latioribus, apice attenuatis, 4-costatis, intervallis late et inæquale fenestratis aut plicatis. Long. 9 mill. Bolivie: Yungas (Musée de Dahlem). — Diffère de *scutellare* Kirsh. par la forme plus allongée, la disposition différente du dessin noir sur la partie antérieure des élytres, les plis plus accentués des intervalles.

**C. subprolongatum** n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad suturam antice nigro vittatis, vitta aliquot postice dilatata,

et apice sat breve et parum anguste nigro vittatis, articulis ultimis antennarum flavis; thorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis prominulis, medio postice fere incarinato aut breve et indistincte sulcato; elytris elongatis, post medium latoribus, apice attenuatis, 4 costatis, intervallis late parum regulariter fenestratis et plicatis. Long. 9 mill. Bolivie (Musée de Dahlem). — Voisin du précédent, en diffère par les élytres élargies plus près de l'extrémité, à aréoles moins creusées avec ces organes à dessin noir apical non maculiforme mais vittiforme.

**C. Kraatzi** n. sp. Elongatus, fere opacus, nigro-piceus, capite antice, articulo ultimo antennarum, coxis femoribusque ad basim flavis, infra corpore pro majore parte rufo-brunnescente; thorace lateraliter testaceo, elytris nigro-piceis, his ad humeros reducte testaceo maculatis et post medium oblique et sinuate testaceo fasciatis; antennis valde depressis, articulo ultimo flavo; thorace sat lato, antice arcuato, angulis posticis prominulis, medio carinato, carina postice minute sed distincte sulcato; elytris elongatis, non latis, lateraliter subsinuatis, tricarinatis, intervallis transverse et approximate fenestratis et multiplicatis. Long. 8 mill. Bolivie (Musée de Dahlem). — Espèce caractérisée par sa forme relativement étroite, ses élytres n'ayant chacune que 3 côtes avec les intervalles munis de nombreux plis, plus ou moins rapprochés.

**Mesopteron longissimum** n. sp. Angustatus, parallelus, parum nitidus, niger, elytris ad humeros breve et ante apicem late ochraceo-testaceis; antennis valde depressis, articulis 3 et sequentibus apice longe dentatis; thorace breve et lato, antice medio paulo prominulo, angulis anticis distinctis, posticis prominulis, medio carinato; elytris angustatis, longissimis, subparallelis, in singulo fortiter bicostatis et minute bicostulatis, intervallis late fenestratis et plicatis. Long. 9 mill. Bolivie (Musée Dahlem). — Voisin de *mesomelas* Kirsh., mais élytres plus longues, en partie noires sur la base et assez largement noires à l'extrémité.

**M. subscutellare** n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, niger, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his ad scutellum minute et apice late nigro notatis; antennis depressis, articulis 3 et sequentibus arcuatis et pectinatis; thorace parum breve et lato, antice sinuato, angulis posticis prominulis, medio carinato; elytris elongatis, angustatis, in singulo fortiter unicarinated et minute bicarinatis, intervallis sat regulariter subquadrato-fenestratis et plicatis. Long. 6 mill. Rép. Argentine: Parana. — Voisin de *angulicollis* Luc., mais prothorax non angulé sur les côtés et antennes différentes.

Un exemplaire, de Bolivie, au Musée de Dahlem, peut être rapporté à cette espèce, comme variété, sous le nom de *Yungasum* et se distingue par le prothorax un peu moins large, le dessus peu brillant, les élytres ornées antérieurement d'une bande suturale noire complète prolongée jusqu'à la macule apicale noire.

**Pseudokarumia** n. gen. Capite sat elongato, mediocre robusto, mandibulis gracilibus, intus dentatis; oculis prominulis, integris; antennis brevibus, crassis, apice paulo attenuatis; thorace subquadrato; elytris brevibus, subparallelis, dehiscentibus; abdomine valde promisculo; pedibus depressis. — Genre établi pour l'espèce suivante. — Voisin de *Drilocephalus* Pic, s'en distingue par la tête moins robuste, les mandibules grêles et surtout par les élytres raccourcies bien moins longues que l'abdomen.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

**Maorolygistopterus Kirschi** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, thorace lateraliter et elytris antice dimidio aurantiacis, his postice nigro-cæruleis, rostro elongato; antennis elongatis, apice attenuatis, articulis mediis diverse dilatatis et sulcatis, apice paulo angulatis; thorace parum lato, lateraliter fere recto, antice paulo attenuato, supra diverse impresso, medio complete sat regulariter sulcato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, subparallelis, apice breve attenuatis, dense et minutissime ruguloso-punctatis, distincte 4-costatis, costis apice pro parte junctis. Long. 10 mill. R. Argentine: B. Ayres (ex Kirsh: communiqué par Kleine). Peut se placer près de *Simoni* Pic, dont il se distingue facilement par les élytres moins allongées et plus largement foncées en arrière, le prothorax à côtés moins largement marqués de clair.

**Synallectula Auberti** n. sp. (1) Oblongus-subovatus, minutus, nitidus, griseo-pubescent, rufo-testaceus, antennis nigris, ad basim testaceis, pedibus testaceis; capite fortiter punctato, oculis distantibus, antennis parum brevibus, subgracilibus; thorace sat breve et lato, antice subarcuato, alutaceo, fortiter sat dense punctato; elytris thorace non latioribus, apice attenuatis, minute striatis, striis fortiter punctatis, intervallis parum latis, minute punctatis. Long. 3,5 mill. Gabon. — Voisin de *notaticeps* Pic, s'en distingue par la coloration plus claire, les stries des élytres plus marquées, etc.

Deux petites espèces, voisines de *Auberti*, la première surtout (celle-ci étant un peu plus étroite avec les antennes plus grêles, la ponctuation plus dense du prothorax) se distinguent ainsi qu'il suit :

1. Antennes grêles. Prothorax à ponctuation dense; élytres moins longues, à stries un peu marquées. Long. 4 mill. Sierra-Leone. *minuta* Pic.

— Antennes un peu plus épaisses. Prothorax à ponctuation un peu écartée; élytres plus longues, à stries en partie indistinctes. Long. 3,5 mill. Abyssinie.

*Raffrayi* Pic.

**Synallectula leonensis** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, luteo pubescens, rufus, membris testaceis, elytris ad suturam et lateraliter nigro notatis. Long. 5 mill. Sierra-Leone. Très voisin de *benitoensis* Pic, en diffère par les antennes moins grêles, le prothorax plus courtement rétréci en avant, la forme plus étroite.

**S. benitoensis** v. nov. *obliteratus*. Elytris rufis, ad suturam paulo piceo vittatis. Gabon. — Chez *benitoensis* Pic et var. le ♂ possède une dent robuste aux cuisses postérieures.

**S. Madoni** n. sp. Oblongo-elongatus, parum convexus, nitidus, griseo pubescens, rufus, antennis nigris, ad basim rufis; capite fortiter punctato, oculis distantibus, antennis gracilibus, thorace paulo superantibus; thorace sat breve et lato, antice subarcuato, dense punctato; elytris thorace non latioribus, sat elongatis, postice attenuatis, minute sed distincte striatis, striis fortiter punctatis, intervallis latis, sat fortiter punctatis. Long. 6 mill. Gabon. — A placer près de *subovata* Pic.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) J'ai obtenu cette espèce, ainsi que les autres de la même provenance, par l'achat des *Hétéromères* de la collection Madon, comprenant celle d'Aubert.



# BONNE ANNÉE !

L'année 1930 s'est achevée en pesant de son poids lourd de catastrophes sur les faibles épaules humaines ; que la nouvelle, aimable et souriante dans le soleil, soit plus légère, facile à supporter, loin de la pluie persistante, des ouragans dévastateurs, des ruines qui s'amoncellent, des morts qui se succèdent. Que l'entomologie tout particulièrement, en 1931, soit vivace et prospère, riche de butin pour les collectionneurs, de découvertes biologiques, pour les observateurs, généreuse de nouveautés pour les voyageurs et les descripteurs.

Les vœux étant brièvement et généralement exprimés, n'oublions pas d'adresser un souvenir ému à ceux de nos collègues qui ne sont plus ; je rends particulièrement hommage à la mémoire du major Sicard, un de mes contemporains et plus vieux correspondants, à qui l'Entomologie doit de nombreuses découvertes et la description de beaucoup de *Coccinellidæ*. Le D<sup>r</sup> Sicard a légué au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ses riches collections, renfermées dans 2.000 boîtes environ. Que ce geste, né de l'esprit justement scientifique, ait, par la suite, de nombreux imitateurs ! Les collections des spécialistes surtout ont leur place véritable dans un établissement public de premier ordre, car là elles ne seront pas perdues et pourront servir aux auteurs et descripteurs de l'avenir. Dans les musées de province, trop souvent les collections d'insectes, faute de soins, deviennent la proie des anthrènes.

Les anciens entomologistes disparaissent successivement, laissant derrière eux un grand vide, que la jeunesse d'aujourd'hui ne semble pas se complaire à essayer de combler. La jeune génération trouve peu captivante l'étude des petits êtres infimes, car elle voit grand ; leur lente démarche ne va plus avec le règne de la trépidation à haute tension, l'amour unique des vitesses sans cesse accélérées. Puisse 1931 (souhait final) nous apporter moins de bruit et de folle vitesse, mettre un peu de plomb (non pas à l'aide du revolver à la mode) dans les jeunes cervelles, enfin guidées par le bon sens moral, l'esprit de travail et de suite. Que les sciences naturelles retrouvent leur recrutement du passé ; qu'elles soient regardées avec faveur, comme il convient, par la génération qui monte, comprises et honorées par les pouvoirs publics.

M. PIC.

---

## Avis et Renseignements divers

Consulter les Nos 436, 437, 438, 440 et 441 de ce journal, où il est question du Prix Thérèse pour 1932.

Des entomologistes ayant demandé quelques précisions à ce sujet, les voici en partie : Il est rappelé que des travaux déjà imprimés (publiés en 1930 ou 1931), peuvent concourir, ainsi que des écrits ou des manuscrits rédigés suivant la **conception variétiste**.

Les manuscrits primés et rédigés en français (il y aura 3 prix à distribuer) pourront, si les auteurs le désirent, être publiés dans « L'Echange » successivement (et suivant la place disponible), principalement en hors-texte, et 25 exemplaires seront accordés gratuitement au titre de **separata**. Un manuscrit non primé lui aussi pourrait être publié dans « L'Echange », mais naturellement après les autres.

La diagnose latine est très critiquée ; il existe même une hostilité marquée contre elle dans certains milieux, parmi les jeunes surtout, alors, convient-il de l'exiger finalement ? Limitée à la présentation des nouveautés, celle-ci n'est pas abusive, son rôle utilitaire ne semble pas contestable. Dans la critique faite contre la diagnose latine, le Directeur de « L'Echange » n'ignore pas qu'il est parfois pris à partie ou directement visé. « Des diagnoses latines de « L'Echange », cela représente 5 mots, alors pourquoi pas nous imposer des descriptions à mots comptés », ou encore : « Le latin à la Pic, on en connaît la valeur. » Les boutades sont toujours bonnes à connaître, sinon utiles à retenir. On fait de l'esprit, mais on manque de logique ou de bienveillance. Le sens pratique des réalités échappe parfois à des entomologistes cependant remplis de bonne volonté, et c'est très regrettable, plus regrettable que la création d'un prix variétiste honni de certains.

Les abonnés sont priés de régler leur abonnement aussitôt après la réception du 1<sup>er</sup> numéro. Quelques entomologistes sont en avance pour leur versement, et la Direction les remercie de leur zèle, ainsi que de leur générosité, lorsque le montant de l'abonnement est volontairement et aimablement augmenté.