



a



c



e



b



d



f

Fig. 24 – *Affixalus dorsalis*. Les expansions de la bande dorsale sur les paupières, caractéristiques de l'espèce, sont visibles chez tous ces individus. Ceux des photos d et e montrent deux stades de régression de la bande dorsale. Sur l'individu photographié en f on peut voir les deux caractères propres à la sous-espèce *regularis* : bande dorsale prolongée jusqu'à l'extrémité du corps et jambe munie d'une seule grande macule claire.




Fig. 25 – *Afrixalus dorsalis*. a : différents aspects de la livrée dorsale ; b : dessous de la tête d'un mâle, montrant la grande taille de la glande gulaire et les plis correspondant au sac vocal ; c : variation de la maculation de l'avant-bras ; d : pied et main (tubercules sous-articulaires distaux simples) ; e : maculation de la jambe, les deux dessous du bas correspondant à la sous-espèce *regularis*.




Fig. 26 - *Afrivalus dorsalis*. Répartition des pointages, courbe de 600 m et cours du fleuve Sanaga. Cartouches : 1, zone forestière (forêt sempervirente et mésophile) ; 2, végétation montagnarde de la Dorsale camerounaise ; 3, savanes guinéennes et forêts-galeries mésophiles ; 4, formations soudano-guinéennes d'altitude de l'Adamaoua ; 5, savanes boisées médio-soudaniennes ; 6, savanes boisées soudano-sahéliennes ; 7, steppes sahélo-soudaniennes ; 8, secteur soudanien d'altitude.